

平成 27 年県民歯科疾患実態調査 報告書

山口県健康福祉部

平成 28 年 10 月

は じ め に

歯・口腔の健康は、生涯を通じて自分の歯でしっかりと噛んで食べることを可能にするだけでなく、子どもの成長や成人期以降の全身の健康に影響を与え、肥満や糖尿病等の生活習慣病の予防に資するなど、全身の健康を保持増進し、私たちが人生を豊かに過ごす上での重要な要素となっています。

このため、県では、平成24年3月に施行された「山口県民の歯・口腔の健康づくり推進条例」を踏まえ平成25年3月に策定された「やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画」に基づき、歯・口腔の健康づくりによる県民の皆様の生涯にわたる健康の保持増進に取り組んでいるところです。

本調査は、県民の歯・口腔の状況や歯科保健意識の実態を明らかにし、今後の歯科保健対策の推進、さらには「健康やまぐち21計画（第2次）」及び「やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画」中間評価・見直し等の基礎資料を得るための調査であり、昭和60年より5年毎に実施してきました。

本報告書は、その結果をまとめたものであり、8020運動や歯・口腔の健康づくりの推進のために広く活用されれば幸いです。

終わりに、本調査の実施に当たり、準備から診査、解析に至るまで、多大な御協力をいただきました皆様に対しまして、深く感謝いたします。

平成28年10月

山口県健康福祉部長 藤井 勉

目 次

I 調査の概要

1	調査の目的	1
2	調査の対象	1
3	調査の期日	1
4	主な調査事項	1
5	調査の方法	1
6	調査に関する秘密の保持	1
7	診査項目	1
8	調査の集計	2
9	報告書の見方について	2
10	調査結果について	2
別表 1	調査地区	3
別表 2	保健所別対象者数等	4
別紙	診査基準	5
	利用上の注意	8
	歯科疾患実態調査票	10
	歯科保健調査票	11

II 歯科疾患実態調査（口腔診査）結果

1	乳歯の状況	16
2	永久歯の状況	19
3	喪失歯と補綴の状況	22
4	歯肉の状況	24
5	歯垢、歯石、歯列・咬合の不正、顎関節、口腔粘膜の状況	25

III 歯科保健調査結果

1	歯みがきの状況	28
2	歯みがき時間帯	28
3	歯みがき時間	29
4	歯間部清掃用器具の使用	29
5	フッ化物配合歯磨剤の使用	30
6	歯科健康教育状況	30
7	歯科健診（検診）受診状況	31
8	歯科健診（検診）受診のきっかけ	31
9	歯の健康意識	32
10	フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた経験	32
11	フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた場所	33
12	フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた方法	33
13	甘味食品摂取状況	34
14	歯や口などの悩みの状況	34
15	義歯の使用状況	35

16	かむ状況	35
17	摂食・嚥下に関する状況	36
18	日常生活の状況	36

IV 歯科疾患実態調査（口腔調査）と歯科保健調査等

1	歯科健診（検診）受診状況と歯肉の所見	37
2	歯科健診（検診）受診状況と日常生活	37
3	咀嚼力と現在歯数	38
4	咀嚼力と喪失歯の補綴の状況	38
5	咀嚼力と歯肉の所見	39
6	咀嚼力とBMI	39
7	喫煙状況と歯肉の所見	40

V 統計表

表 1	乳歯 う蝕有病者数	41
表 2	乳歯 現在歯数	42
表 3	乳歯 1人平均現在歯数	43
表 4	乳歯 う歯の状況	44
表 5	永久歯 う蝕有病者数	45
表 6	永久歯 現在歯数及び喪失歯数	46
表 7	永久歯 1人平均現在歯数及び喪失歯数	47
表 8	喪失歯のある者の数	48
表 9	永久歯 現在歯数 20本以上の者	50
表 10	永久歯 補綴の状況	51
表 11	永久歯 補綴物の状況（補綴の種類）	52
表 12	歯肉の所見の状況	53
表 13	歯垢、歯石、歯列・咬合不正、顎関節、口腔粘膜等の所見の状況	55
表 14	歯みがきの状況	56
表 15	歯みがき時間帯	57
表 16	歯みがき時間	58
表 17	歯間部清掃用具の使用	59
表 18	フッ化物配合歯磨剤の使用	60
表 19	歯科健康教育状況	61
表 20	歯科健診（検診）受診状況	62
表 21	歯科健診（検診）受診のきっかけ	63
表 22	歯の健康意識	64
表 23	フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた経験	66
表 24	フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた場所	67
表 25	フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた方法	68
表 26	甘味食品摂取状況	69
表 27	歯・口などの悩みの状況	70
表 28	義歯の使用状況	72
表 29	かむ状況	73
表 30	摂食・嚥下に関する状況	74
表 31	日常生活の状況	79
表 32	咀嚼力別 年齢	80

表 33	咀嚼力別	義歯の使用状況	-----	80
表 34	咀嚼力別	かむ状況	-----	80
表 35	咀嚼力別	摂食・嚥下に関する状況	-----	81
表 36	年次推移	(永久歯)	-----	82

VI 参考

用語説明	-----	85
平成 27 年県民健康栄養調査・県民歯科疾患実態調査検討会設置要領	-----	86

I 調査の概要

本県の歯科疾患実態調査は、昭和 60 年（1985 年）に第 1 回の調査が行われたのを始めに 10 年後の平成 7 年（1995 年）に第 2 回、以降 5 年毎の平成 12 年（2000 年）に第 3 回、平成 17 年（2005 年）に第 4 回、平成 22 年（2010 年）に第 5 回、平成 27 年（2015 年）に第 6 回の調査が行われた。

1 調査の目的

この調査は、本県の歯科保健状況を把握することにより、これまで実施されてきた歯科保健施策、「健康やまぐち 21 計画(第二次)」及び「歯・口腔の健康づくり推進計画」の評価並びに今後の歯科保健医療対策の推進のための基礎資料を得ることを目的とする。

なお、今回の調査では、栄養状態と咀嚼の状況の関係性を把握するため、咀嚼力検査を行った。

2 調査の対象

全県の世帯及びその構成員を調査対象とし、平成 22 年国民生活基礎調査区から層化基準として保健医療圏域別に人口割合を考慮し、それぞれに無作為抽出した 24 地区の世帯（1,016 世帯）の年齢満 1 歳以上の構成員（2,306 人）（別表 1）を調査客体とした。

これらの対象者の受診（回答）状況は別表 2 のとおりで、歯科疾患実態調査（口腔診査）受診率 22.9%、歯科保健調査回答率 48.6%であった。

3 調査の期日

調査は、平成 27 年 11 月実施の県民健康栄養調査（身体状況調査）と併せて実施した。

4 主な調査事項

（1）歯科疾患実態調査

- 1) 現在歯の状況
- 2) 喪失歯及びその補綴状況
- 3) 歯肉の状況
- 4) その他の所見調査

（2）歯科保健調査

5 調査の方法

調査は、平成 27 年県民歯科疾患実態調査必携に基づき、実施した。

- （1）調査は市町の協力を得て、調査対象地区を管轄する保健所長が口腔診査を担当する歯科医師及び診査補助員（歯科衛生士等）並びに保健所職員を調査員に任命して実施した。なお、下関保健所については、下関市長が行った。
- （2）調査の具体的な実施方法については、保健所長は事前に調査地区において市町の調査員等と十分な打ち合わせを行うとともに、調査地区の歯科関係者の協力を得て調査を円滑に実施できるように努めた。
- （3）調査対象地区の世帯は、県民健康栄養調査と同一とし、事前に調査の趣旨、方法等の周知徹底を図り、調査に対する協力体制の確保に配慮した。

6 調査に関する秘密の保持

調査の実施にあたっては、被調査者の秘密保持に特に留意した。

7 診査項目

本調査は、次の診査項目について実施した。診査基準の詳細については、別紙参照とする。

（1）歯の状況（1 歳以上）

ア 現在歯

現在歯とは、歯の全部又は一部が口腔に現れているものをいい、（ア）健全歯、（イ）未処置歯、（ウ）処置歯 の 3 種に分類する。

イ 喪失歯

喪失歯とは、抜去又は脱落により喪失した永久歯をいう。ただし、智歯は含めない。

（2）永久歯喪失への補綴の状況（15 歳以上）

永久歯の欠損部について、補綴物装着の有無を診査する。

(3) 歯肉の状況

永久歯列について、5歳以上で歯肉出血を、15歳以上で歯肉出血と歯周ポケットを、臼歯部と前歯部の特定の歯において診査する。

	コード	所見
歯肉出血	0	健全
	1	<u>出血あり</u>
	9	除外歯
	X	該当する歯なし
歯周ポケット	0	健全
	1	<u>4～5 mmに達するポケット</u>
	2	<u>6 mmを超えるポケット</u>
	9	除外歯
	X	該当する歯なし

(4) その他の所見

- ア 歯垢
- イ 歯石
- ウ 歯列・咬合
- エ 顎関節
- オ 口腔粘膜
- カ 咀嚼力検査

咀嚼力検査は、検査用ガムを用いて診査した。

8 調査の集計

調査地区を管轄する健康福祉センター（保健所）において各調査票の内容を審査し、入力を行った。

山口県健康福祉部健康増進課において、各健康福祉センター（保健所）から提出された入力データを統合するとともに、集計は一部外部に委託して行った。

なお、咀嚼力検査業務については、山口県立大学にて実施した。

9 報告書の見方について

比率は、すべて百分率で表し小数点以下第二位を四捨五入したため、百分率の合計が100%にならないことがある。

10 調査結果について

本調査では、統計評価に満たない調査協力者数、及び性年齢構成の偏り等があることから、調査結果については、取扱いに留意を要する。

別表 1 調査地区

保健所	地区 番号	単位区 番号	地区名	国民健康・栄養 調査該当地区
下 関	01	1	下関市中之町	○
		2	下関市岬之町	
		3	下関市清末陣屋	
岩 国	02	1	岩国市平田	
		2	岩国市由宇町西	
		3	岩国市錦町大原	
柳 井	03	1	柳井市柳井琴風	
	04	1	周防大島町大字戸田西浜	
周 南	05	1	周南市大字須万	○
		2	周南市原宿町	
	06	1	光市岩狩	
	07	1	下松市生野屋	
山 口	08	1	山口市嘉川	
		2	山口市吉敷下東	
		3	山口市吉田	
	09	1	防府市大字下右田	
		2	防府市華浦	
		3	防府市新橋町	
宇 部	10	1	宇部市西平原	○
		2	宇部市中村	
		3	宇部市東新川町	
		4	宇部市居能町	
長 門	11	1	長門市西深川	○
萩	12	1	阿武町大字奈古	

別表 2 保健所別対象者数等

保健所	地区 番号	単位区 番号	H22 国勢調査		歯科疾患実態調査			咀嚼力調査			歯科保健調査		
			世帯数	対象者数	計	男性	女性	計	男性	女性	計	男性	女性
下 関	01	1	40	74	9	3	6	7	3	4	30	10	20
		2	31	60	15	5	10	12	4	8	25	10	15
		3	40	102	20	11	9	19	7	12	48	23	25
岩 国	02	1	33	91	31	13	18	26	9	17	67	32	35
		2	41	92	29	11	18	22	6	16	49	23	26
		3	23	47	19	9	10	19	9	10	26	11	15
柳 井	03	1	109	298	40	12	28	22	4	18	59	21	38
	04	1	22	42	21	7	14	19	7	12	41	18	23
周 南	05	1	27	55	13	3	10	15	5	10	22	8	14
		2	48	87	14	3	11	11	3	8	18	7	11
	06	1	32	72	11	4	7	11	4	7	38	16	22
	07	1	32	77	17	7	10	12	3	9	43	20	23
山 口	08	1	32	87	30	16	14	26	13	13	57	28	29
		2	51	96	20	9	11	19	9	10	58	26	32
		3	73	174	29	11	18	22	8	14	84	40	44
	09	1	71	199	52	23	29	44	20	24	108	50	58
		2	35	100	25	10	15	10	7	3	40	16	24
		3	35	79	21	7	14	13	2	11	48	19	29
宇 部	10	1	37	78	20	10	10	13	6	7	38	21	17
		2	46	79	9	1	8	7	1	6	29	11	18
		3	42	71	14	3	11	10	2	8	27	7	20
		4	36	53	7	3	4	7	3	4	18	8	10
長 門	11	1	46	125	32	12	20	25	10	15	107	55	52
萩	12	1	34	68	30	12	18	23	10	13	41	19	22
計			1,016	2,306	528	205	323	414	155	259	1,121	499	622

別紙 診査基準

本調査は、次に掲げる基準に従って診査する。

(1) 歯の状況（1歳以上）

ア 現在歯

- ・現在歯は、（ア）健全歯、（イ）未処置歯、（ウ）処置歯 の3種に分類する。現在歯とは、歯の全部又は一部が口腔に現れているものをいう。
- ・過剰歯は含めないこととし、癒合歯は1歯として取り扱い、その場合の歯種名は上位歯種名をもってこれにあてる。（例：乳中切歯と乳側切歯の癒合歯は、乳中切歯とする。）

（ア）健全歯

- ・健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置の認められないもの（以下に記す未処置歯及び処置歯の項に該当しないもの）をいう。
- ・咬耗、摩耗、着色、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周炎、形態異常、エナメル質形成不全等の歯であっても、それとう蝕のないものは健全歯とする。
（注）歯質の変化がなく、単に小窩裂溝が黒褐色に着色しているもの、平滑面で表面的に淡褐色の着色を認めるが歯質は透明で滑沢なもの等は、すべて健全歯とする。
- ・予防填塞（フィッシャー・シーラント）の施してある歯については可能な限り問診し、う蝕のない歯に予防填塞を施したものは健全歯とする。
（注）予防填塞と処置歯との鑑別を行う場合、一般的に予防填塞はレジン充填に比べ、
 - a 色調が異なる
 - b 填塞物の辺縁の形態が裂溝状で細く、不揃いである
 - c 填塞物表面の粗造感が少ない場合が多いことを考慮する。

（イ）未処置歯

未処置歯は、①明らかなう窩、②エナメル質下の脱灰・浸蝕、③軟化底・軟化壁が確認できる小窩裂溝、平滑面のう蝕病変とする。なお、確認のためCPIプローブを用いることが望ましい。

（注）フッ化ジアンミン銀（サホライド）のみを塗布したと考えられる歯は未処置歯とする。

（ウ）処置歯

- ・処置歯とは歯の一部又は全部に（ア）充填、（イ）クラウン等を施しているものをいう。
- ・歯周炎の固定装置、矯正装置、矯正後の保定装置、保隙装置及び骨折副木装置は含まれない。
- ・治療が完了していない歯並びに処置歯での2次う蝕又は他の歯面等で未処置う蝕が認められる場合、未処置歯として扱う。
- ・予防填塞（フィッシャー・シーラント）の施してある歯については、可能な限り問診しう蝕のない歯に予防填塞を施したものは健全歯とするが、明らかにう蝕のあった歯に填塞したものは処置歯とする。
- ・根面板は処置歯とする。
 - a 充填
セメント充填、レジン充填、アマルガム充填、ポーセレンインレー、合金（インレー、アンレー及び3/4冠を含む）等により、充填又は一部歯冠修復しているものはこれに含める。架工義歯の支台歯であっても、一部修復しているものはこれに含める。
 - b クラウン等
全部鑄造冠、陶材焼付鑄造冠、レジン前装鑄造冠、ジャケットクラウン等、歯冠のすべてを修復しているものをいい、架工義歯の支台歯であってもこれに含める。

イ 喪失歯

抜去又は脱落により喪失した永久歯をいう。ただし、智歯は含めない。

（注）被調査者の年齢を考慮すること。

乳歯は診査対象としない。

インプラントは喪失歯とする。

(2) 永久歯喪失への補綴の状況（15歳以上）

永久歯の欠損部について、補綴物装着の有無及び、補綴処置の状況について診査する。

部分床義歯及び全部床義歯は日常使用しているものであれば、診査時に装着してもよいが、一部破損していたりあるいは欠損部の状況と一致していないものは補綴されていないものとする。

なお、乳歯の義歯・保隙装置は含まない。

補綴完了 : 喪失歯のある部位が完全に補綴処置を完了しているもの

補綴一部未実施 : 喪失歯のある部位の一部は補綴されているが、一部は補綴されていないもの

補綴未実施 : 喪失歯が存在しており、全く架工義歯や床義歯が施されていないもの

補綴不要 : 喪失歯は存在するが、部位によって、又は状態によっては補綴処置が必ずしも必要と考えられないもの

(3) 歯肉の状況 (歯肉出血 5歳以上、歯周ポケット 15歳以上)

永久歯列について、WHOのCPI (community periodontal index、地域歯周疾患指数) を測定する。改定法に準拠して測定を行うが、改定CPI法で提示された全歯ではなく、以下に記載する特定歯とする。

7 6	1	6 7
7 6	1	6 7

(20歳未満の場合、第2大臼歯を除外)

WHOプローブを用いて上顎、下顎とも頬側面 (近・遠心) 及び舌側面 (近・遠心) の4点について以下の基準で診査し、最高コード値を記入する。ただし、同顎、同側の第1、第2大臼歯については、両歯の最高点を記入する。

	コード	所見	判定基準
歯肉出血	0	健全	以下の所見が認められない
	1	出血あり	プロービング後10～30秒以内に出血が認められる
	9	除外歯	プロービングが出来ない歯 (例：根の露出が根尖に及ぶ)
	X	該当する歯なし	
歯周ポケット	0	健全	以下の所見がすべて認められない
	1	4～5mmに達するポケット	プローブの黒い部分に歯肉縁が位置する
	2	6mmを超えるポケット	プローブの黒い部分が見えなくなる
	9	除外歯	プロービングが出来ない歯 (例：根の露出が根尖に及ぶ)
	X	該当する歯なし	

- ・5～14歳未満の者の場合、歯肉出血のみ測定し、歯周ポケットの測定は行わない。
- ・対象中切歯の欠損により診査が不能な場合は、反対側同名歯を診査する。
- ・プロービングは、WHOプローブ先端の球を歯の表面に沿って滑らせる程度の軽い力 (20g) で操作し、遠心の接触点直下から、やさしく上下に動かしながら近心接触点直下まで移動させる。

(4) その他の所見

ア 次の所見について診査する。(1歳以上)

(ア) 歯垢

歯垢の付着状態について診査する。

(イ) 歯石

歯肉縁下4mmまでのプロービングによる検出を含む。

(ウ) 歯列・咬合

反対咬合、上顎前突、開咬、叢生、正中離開等について診査する。

(エ) 顎関節

開口障害、関節雑音、疼痛、顎の偏位等の異常について診査する。

(オ) 口腔粘膜

口唇、口角、舌、舌小帯、口蓋、その他の粘膜等の異常について診査する。

イ 咀嚼力検査 (20歳以上、義歯使用者を含む)

検査用ガム 1 枚を 2 分間自由咀嚼し、咀嚼後のガムをポリ袋に入れ、直径 3 cm、厚さ 2 mm に伸ばし、検体とする。検体は、測色色差計（日本電色工業株式会社：ZE6000）により計測し、以下の基準で判定する。

評価	判定基準
かめていない	$a^* \leq 10.0$
あまりかめていない	$10.0 < a^* \leq 15.0$
かめている	$15.0 < a^* \leq 25.0$
よくかめている	$25.0 < a^* \leq 30.0$
非常によくかめている	$30 < a^*$

a^* ：赤色度合

利用上の注意

本報告書に示した数値等は次の方法により算出した。

1 う蝕有病者率

1) 乳歯

$$\text{う蝕有病者率 (\%)} = \frac{\text{乳歯う歯のある者の数}}{\text{被調査者数}} \times 100$$

(注) う歯のある者の数 : 未処置歯、処置歯のいずれかを1本以上有する者の数
被調査者 : 調査を受けた1歳以上15歳未満の者で、う歯のない者、う歯のある者、歯のない者の総数

2) 永久歯

$$\text{う蝕有病者率 (\%)} = \frac{\text{永久歯う歯のある者の数}}{\text{被調査者数}} \times 100$$

(注) う歯のある者の数 : 未処置歯、処置歯のいずれかを1本以上有する者の数
被調査者 : 調査を受けた5歳以上の者で、う歯のない者、う歯のある者、歯のない者の総数

2 1人平均現在歯数

1) 乳歯

$$1 \text{ 人平均現在歯数 (本)} = \frac{\text{乳歯の現在歯数}}{\text{被調査者数}}$$

(注) 現在歯数 : 健全歯、未処置歯、処置歯の総数
被調査者 : 前記1-1)に同じ

2) 永久歯

$$1 \text{ 人平均現在歯数 (本)} = \frac{\text{永久歯の現在歯数}}{\text{被調査者数}}$$

(注) 現在歯数 : 前記2-1)に同じ
被調査者 : 前記1-2)に同じ

3 喪失歯所有者数及び1人平均喪失歯数(永久歯)

1) 喪失歯所有者数

$$\text{喪失歯所有者数 (\%)} = \frac{\text{喪失歯のある者の数}}{\text{被調査者数}} \times 100$$

(注) 喪失歯のある者の数 : 喪失歯を1本以上有する者の数
被調査者 : 前記1-2)に同じ

2) 1人平均喪失歯数

$$1人平均喪失歯数(本) = \frac{\text{喪失歯数}}{\text{被調査者数}}$$

(注) 喪失歯数：喪失歯の総数
被調査者：前記1－2)に同じ

4 DMFT指数

$$DMFT指数 = \frac{\text{永久歯のう歯数} + \text{喪失歯数}}{\text{被調査者数}}$$

(注) う歯数：未処置歯、処置歯の総数
喪失歯数：喪失歯の総数
被調査者：前記1－2)に同じ

第2号様式

平成27年11月調査

県民歯科疾患実態調査票

保健所名
調査日 平成 27年 月 日
調査歯科医師名

市町名		地区番号		単位区番号		世帯番号		世帯員番号	
-----	--	------	--	-------	--	------	--	-------	--

第1 問診により記入すること

(1) 調査参加の有無	1 有	2 無	(2) 性別	1 男	2 女
(3) 生年月日	1 平	2 昭	3 大	4 明	年 月 日 (満 歳)
(4) 咀嚼力検査の参加の有無 (20歳以上)	1 有	2 無			

第2 診査時に記入すること

(5) 歯の状況 (1歳以上)

永久歯	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	上顎
(右)																	(左)
乳歯																	
乳歯																	
永久歯	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	下顎
1 健全歯																	
2 未処置歯																	
3 処置歯																	
4 処置歯																	
5 喪失歯																	
架工義歯																	

(6) 永久歯喪失への補綴の状況 (15歳以上)

0 喪失歯なし
1 補綴完了
2 補綴一部未実施
3 補綴未実施
4 補綴不要

※(6)が1または2の場合、補綴の種類(複数回答可)
1 架工義歯
2 部分床義歯
3 全部床義歯
4 インプラント

(7) 歯肉の状況 (永久歯列)

① 歯肉出血 (5歳以上)

7-1又は6-1 1-1 1-6又は1-7 最大値

上顎
下顎

7-1又は6-1 1-1 1-6又は1-7

0 健全
1 ブローピング後に出血あり
9 除外歯
X 該当歯なし

② 歯周ポケット (15歳以上)

7-1又は6-1 1-1 1-6又は1-7 最大値

上顎
下顎

7-1又は6-1 1-1 1-6又は1-7

0 健全
1 ポケットの深さが4～6mm未満
2 ポケットの深さが6mm以上
9 除外歯
X 該当歯なし

(8) その他の所見 (1歳以上)

① 歯垢 0 なし 1 あり
② 歯石 0 なし 1 あり
③ 歯列・咬合 0 所見なし 1 所見あり
④ 顎関節 0 所見なし 1 所見あり
⑤ 口腔粘膜 0 所見なし 1 所見あり

第3 診査

(5)

永久歯	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	上顎
(右)																	(左)
乳歯																	
乳歯																	
永久歯	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	下顎

(5) ※乳歯う歯の分類 (1～4歳以下)

0 う歯なし
1 A型(上顎前歯のみ又は臼歯のみう歯)
2 B型(上顎前歯及び臼歯のう歯)
3 C1型(下顎前歯のみう歯)
4 C2型(下顎前歯を含むう歯)

(6)		(6)※	
(7)①		(7)②	
(8)①		(8)②	
(8)③		(8)④	
(8)⑤			

平成27年調査

歯 科 保 健 調 査 票

(お願い)

この調査は、県民の歯科保健の状況を知るための大切な調査です。
お答えになった内容については、統計以外の目的には使用しません。
ご記入が終わりましたら、歯科健診日に会場にご持参ください。
ご協力をよろしくお願いいたします。

保健所名 _____

市町村名 _____

地区番号	単位区番号	世帯番号	世帯員番号	性別	年齢
				1 男性	歳
				2 女性	

山 口 県

＜ご記入のお願い＞

- ・ あてはまる番号に○をつけてください。
- ・ ご自分で記入できない方は、ご家族の方が記入してください。
- ・ ご記入は、鉛筆又はボールペンをご使用ください。

質問1 あなたは、歯をみがきますか。

- 1 毎日みがく 2 時々みがく 3 みがかない

質問2 質問1で「1または2」と回答した方に質問します。

(1) あなたは、いつ歯をみがきますか。(あてはまるもの全て記入してください)

- 1 起床後 3 昼食後 5 就寝前
2 朝食後 4 夕食後 6 間食（おやつ、夜食等）の後

(2) あなたは、1回あたり何分くらい歯をみがきますか。

- 1 3分以内 2 3～10分 3 10分以上

(3) あなたは、歯をみがく時、歯ブラシ以外にどのような歯間部清掃用器具を使用していますか。(あてはまるもの全て記入してください)

- 1 デンタルフロス 3 その他（口腔洗浄器等）
2 歯間ブラシ 4 使用していない

(参考) デンタルフロス：歯と歯の間の歯垢や食片を除去し清掃するための細い糸状の清掃用具
口腔洗浄器：水流により口腔内を清掃する機械

質問3 歯磨剤は、フッ化物配合歯磨剤を使用していますか。

- 1 使用している 2 使用していない 3 わからない

質問4 あなたは、正しい歯ブラシの使い方や歯のみがき方について、指導を受けたことがありますか。

- 1 受けたことがある
2 受けたことがないが、今後受けたと思っている
3 受けたことがなく、今後も受けない

質問5 あなたは、年に1回以上、歯の健診（検診）を受けていますか。

- 1 受けている 2 受けていない

質問6 質問5で「1」と答えた方に質問します。 受けるきっかけは何ですか。

- 1 市町からの歯の健診（検診）の案内
2 かかりつけ医療機関からの案内
3 自分で定期的に受けるよう心がけている
4 その他

（上記以外のきっかけの場合、記入してください。）

質問7 あなたは、ふだん自分の歯の健康について気を付けていることがありますか。
（あてはまるもの全て記入してください）

- 1 定期的に歯科健診（検診）を受けている
2 定期的に歯石除去を受けている
3 定期的に歯みがきの指導を受けている
4 食事の後、歯をみがいている
5 自宅で、フッ化物配合の製品（歯磨剤、ジェル、洗口剤等）を使用している
6 歯みがきのとき、鏡で口のなかを見ている
7 よくかんで食べるようにしている
8 その他

（上記以外に行っていることがあれば、記入してください。）

- 9 注意していることは特にない

※質問8～10は、1～14歳の方のみお答えください。

質問8 あなたは、今までにフッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けたことがありますか。

- 1 ある 2 ない 3 わからない

質問9 質問8で「1」と答えた方に質問します。

①どこで受けましたか。（あてはまるもの全て記入してください）

- 1 市町保健センター 3 保育園・幼稚園 5 その他
2 医療機関 4 小学校・中学校

②どのような方法でしたか。

- 1 塗布 2 洗口 3 その他

1 1回 2 2回 3 3回以上 4 とっていない

質問 11 あなたは、歯や口の中について気になることがありますか。
(あてはまるもの全て記入してください)

- | | |
|------------------|--|
| 1 歯が痛む | 7 歯の色 |
| 2 歯がしみる | 8 その他 |
| 3 歯が動く | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 4em; margin-right: 10px;">{</div> <div> 上記以外にあれば、記入してください </div> </div> |
| 4 歯肉（歯ぐき）から血がでる | |
| 5 歯肉（歯ぐき）がはれぼったい | |
| 6 歯並び | 9 気になることはない |

質問 12 あなたは、義歯（入れ歯、着脱可能なもの）を使用していますか。

- 1 使用している 2 使用していない

1 何でもかんで食べることができる 3 かめない食べ物が多い

2 一部かめない食べ物がある 4 かんで食べることはできない


A	ゆっくりよくかんで食事をする	(1 はい	2 いいえ)
B	半年前に比べて固いものが食べにくくなった	(1 はい	2 いいえ)
C	お茶や汁物等でむせることがある	(1 はい	2 いいえ)
D	口の渇きが気になる	(1 はい	2 いいえ)
E	左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる	(1 はい	2 いいえ)

1 一人でどこへでも出かけられる 3 付添者とともに出かける
2 家の近所まで一人で出かけられる 4 家からはほとんど出ない


– 3 –

Ⅱ 齒科疾患実態調査 (口腔診査) 結果

歯科疾患実態調査（口腔診査）の受診者は、男性が 38.8%、女性が 61.2%であった。



年代別にみると、70 歳代が 26.5%と最も多く、次いで 60 歳代（20.5%）であった。






1 乳歯の状況

(1) 乳歯の1人平均現在歯数(15歳未満)

1人当たりの平均現在歯数は、10.9本であった。


年齢別にみると、1歳で13.0本、2歳で17.8本、3歳で20.0本であった。



(2) 乳歯のう蝕有病者（15 歳未満）




乳歯のう蝕有病者の割合は、24.6%であった。

年齢別にみると、ピークは9歳（66.7%）であった。



(3) 乳歯の処置状況（15歳未満）


う歯のある者の処置状況において、処置完了者の割合は14.8%であり、未処置歯を有する者（未処置者及び処置歯・未処置歯併有者）は9.8%であった。




2 永久歯の状況

(1) 永久歯の1人平均現在歯数（5歳以上）

1人平均現在歯数は、20.2本であった。




永久歯の1人平均未処置歯数は、20歳代以外の年代では1本以下であった。




(2) 永久歯のう蝕有病者（5歳以上）

永久歯のう蝕有病者数の割合は、80.3%であった。

年齢別にみると、10歳代は40.6%だが、20歳代から70歳代は8割以上であった。



う蝕有病者については、30歳代から70歳代では半数以上が処置完了者であった。



○12歳児でう蝕のない者

H27
71.4%

※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画
目標(H34) 65.0%

○中学生におけるう蝕のない者

H27
中学生(12～14歳)
68.8%

※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画
目標(H34) 60.0%


○未処置歯を有する者

H27
40歳(35～44歳)
29.2%
60歳(55～64歳)
36.8%


※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画
目標(H34) 40歳(35～44歳) 10.0%
目標(H34) 60歳(55～64歳) 10.0%

(3) 自分の歯を20本以上保有する者

自分の歯を20本以上保有する者の割合は、80歳以上で21.7%であった。



80歳は、1人平均13.0本の歯を有していた。



○60歳で24歯以上の自分の歯を有する者

	H27
60歳(55～64歳)	59.6%

○80歳で20歯以上の自分の歯を有する者

	H27
80歳(75～84歳)	36.9%


※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画
目標(H34) 60歳(55～64歳) 75.0%
80歳(75～84歳) 50.0%

3 喪失歯と補綴の状況

(1) 喪失歯（5歳以上）

喪失歯のある者の割合は 67.3%であった。

年齢別にみると、50 歳代で 6 割以上、70 歳代以上で 9 割以上の者に喪失歯があった。




○喪失歯のない者

	H27
40 歳(35～44 歳)	75.0%



※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画
目標(H34) 75.0%

すべての歯（28 本）を失った者は、40 歳代以上でみられた。



(2) 補綴の状況 (15 歳以上)

補綴完了者の割合は 63.4%であり、未実施のある者（一部未実施者・未実施者）は 25.3%であった。




4 歯肉の状況

①歯肉出血（5歳以上）


プロービング後に歯肉出血がみられる者の割合は、31.0%であった。

年齢別にみると、20歳代の38.5%が最も多く、次いで70歳代（37.1%）であった。



②歯周ポケット（15歳以上）

歯周ポケットがみられる者の割合は、45.4%であった。15～19歳で10.0%に歯周ポケットがみられ、40歳代以上で、歯周ポケットの深さが6mm以上の者がみられた。



○歯肉に所見を有する者

	H27
高校生(15～17歳)	12.5%
20歳代(20～29歳)	38.5%
80歳代(80～89歳)	64.3%

※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画

目標(H34) 高校生 40.0%
20歳代 40.0%
80歳代 70.0%

○進行した歯周炎を有する者



	H27
40歳代(40～49歳)	50.0%
60歳代(60～69歳)	57.0%

※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画

目標(H34) 40歳代(40～49歳) 25.0%
60歳代(60～69歳) 35.0%

5 歯垢、歯石、歯列・咬合の不正、顎関節、口腔粘膜の状況（1歳以上）



歯垢のある者の割合は47.9%で、歯石のある者の割合は37.7%であった。



歯列・咬合については、20 歳代の 38.5%の者に所見がみられた。


顎関節については、30 歳代以降で所見がみられた。

口腔粘膜については、60 歳代以降で所見がみられた。




Ⅲ 齒科保健調査結果

歯科保健調査の回答者 1,121 人は、男性が 44.5%、女性が 55.5%であった。




年代別にみると、70 歳代が 20.0%と最も多く、次いで 60 歳代（17.4%）であった。



1 歯みがきの状況（1歳以上）

「あなたは、歯をみがきますか」


歯みがき状況を見ると、毎日歯をみがく者が 93.6%と最も多く、次いで、時々みがく者（4.9%）であった。



2 歯みがき時間帯

「あなたは、いつ歯をみがきますか」


歯みがきの時間帯を見ると、朝食後が 62.5%と最も多く、次いで就寝前（57.6%）であった。



3 歯みがき時間

「あなたは、1回あたり何分くらい歯をみがきますか。」


歯みがき時間は、3分以内が67.5%と最も多く、次いで3～10分（30.0%）であった。



4 歯間部清掃用器具の使用

「あなたは、歯をみがく時、歯ブラシ以外にどのような歯間部清掃用器具を使用していますか。」


歯間部清掃用具の使用割合は、歯間ブラシが24.5%と最も多く、次いでデンタルフロス（13.5%）であった。いずれかの歯間部清掃用器具を使用している者は、38.0%であった。



5 フッ化物配合歯磨剤の使用

「歯磨剤は、フッ化物配合歯磨剤を使用していますか。」

フッ化物配合歯磨剤を使用している者の割合は、44.3%と最も多く、次いで、わからない者(28.5%)であった。



○フッ化物配合歯磨剤を使用する者

	H27
学齢期(6～17 歳)	53.7%
成人期(20～64 歳)	45.1%


※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画

目標(H34) 学齢期(6～17 歳) 80.0%
成人期(20～64 歳) 60.0%

6 歯科健康教育状況

「あなたは、正しい歯ブラシの使い方や歯のみがき方について、指導を受けたことがありますか。」


歯科健康教育を受けたことがある者の割合は、70.0%であった。



7 歯科健診（検診）受診状況

「あなたは、年に1回以上、歯の健診（検診）を受けていますか。」

過去1年間に歯科健診（検診）を受診した者の割合は、39.9%であった。



○過去1年間に歯科検診を受診した者

	H27
成人期(20～64歳)	33.3%
高齢期(65歳以上)	34.8%
中山間地域(20歳以上)	34.1%


※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画

目標(H34)	成人期(20～64歳)	65.0%
	高齢期(65歳以上)	65.0%
	中山間地域(20歳以上)	65.0%

8 歯科健診（検診）受診のきっかけ

「受けるきっかけは何ですか。」

歯科健診（検診）受診のきっかけをみると、「かかりつけ医療機関からの案内」が37.6%と最も多く、次いで「自分で定期的に受けるよう心がけている」(37.1%)であった。




9 歯の健康意識

「あなたは、ふだん自分の歯の健康について気を付けていることがありますか。」

ふだん自分の歯の健康について気を付けていることがある者の割合は79.0%であった。


「食事の後、歯をみがいている」者が43.4%と最も多く、次いで「よくかんで食べるようにしている」(29.4%)であった。



10 フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた経験 (1～14歳)

「あなたは、今までにフッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けたことがありますか。」

フッ化物塗布やフッ化物洗口を受けたことがある者は、73.0%であった。



○フッ化物歯面塗布を受けたことのある者(3歳)


	H27
3歳	28.6%

※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画
目標(H34) 70.0%

11 フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた場所（１～14 歳）

「どこで受けましたか。」


フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた場所は、医療機関が 56.0%で最も多く、次いで小学校・中学校（42.0%）であった。



12 フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた方法（１～14 歳）

「どのような方法でしたか。」


フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた方法をみると、塗布が 78.0%で最も多く、次いで洗口（29.0%）であった。



13 甘味食品摂取状況（1～14歳）

「あなたは、間食として甘味食品・飲料を平均して1日何回とっていますか。」


甘味食品摂取状況をみると、1日に1回が48.2%と最も多く、次いで2回（26.3%）であった。とっていない者は、6.6%であった。



14 歯や口などの悩みの状況（10歳以上）

「あなたは、歯や口の中について気になることがありますか。」


歯や口の中について気になることのある者は、半数以上であった。



15 義歯の使用状況（20 歳以上）

「あなたは、義歯（入れ歯、着脱可能なもの）を使用していますか。」


義歯を使用している者の割合は、37.9%であった。



16 かむ状況（65 歳以上）

「あなたは、かんで食べることができますか。」

かむ状況をみると、何でもかんで食べることができる者が 73.1%と最も多く、次いで、一部かめない食べ物がある者（23.3%）であった。



○咀嚼良好者（何でもかんで食べることができる者）


	H27
60 歳代(60～69 歳)	78.5%
80 歳代(80～89 歳)	63.0%

※やまぐち歯・口腔の健康づくり推進計画
 目標(H34) 60 歳代（60～69 歳） 80.0%
 80 歳代（80～89 歳） 60.0%

17 摂食・嚥下に関する状況（65 歳以上）

「次のA～Eについて、それぞれ「1 はい」、又は「2 いいえ」でお答えください。」


ゆっくりよくかんで食事をする者は68.6%であった。半年前に比べて固いものが食べにくくなった者とお茶や汁物等でむせることがある者、口の渇きが気になる者は、約20%であった。



18 日常生活の状況（65 歳以上）

「あなたの日常生活はどうですか。」


日常生活の状況をみると、一人でどこまでも出かけられる者が77.6%と最も多く、次いで、家の近所まで一人で出かけられる者（14.3%）であった。



IV 歯科疾患実態調査（口腔調査）と 歯科保健調査等


1 歯科健診（検診）受診状況と歯肉の所見

歯科健診（検診）を受けていない者は、受けている者に比べて、プロービング後の歯肉出血の所見のある者が多い傾向にある。




2 歯科健診（検診）受診状況と日常生活（65歳以上）

歯科健診（検診）を受けている者は、受けていない者に比べて、一人でどこまでも出かけられる者が多い傾向にある。




3 咀嚼力と現在歯数（65 歳以上）

現在歯数が 20 本以上の者は、19 本以下の者に比べて、非常によくかめている・よくかめている者が多い傾向にある。




4 咀嚼力と喪失歯の補綴の状況（65 歳以上）

処置完了者は、一部未処置・未処置者に比べて、非常によくかめている・よくかめている者が多い傾向にある。




5 咀嚼力と歯肉の所見（65 歳以上）

歯周ポケットがみられる者は、健全な状態の者に比べて、非常によくかめている・よくかめている者が少ない傾向にある。



6 咀嚼力とBMI（70 歳以上）


BMI が 25.0 以上の者は、25.0 未満の者に比べて、非常によくかめている・よくかめている者が少ない傾向にある。




7 喫煙状況と歯肉の所見（40 歳以上）

現在、継続的に（毎日または時々）吸っている者は、プロービング後に歯肉出血がみられる者が多い傾向にある。

①歯肉出血



②歯周ポケット



V 統計表

割合や比率の％値は、データを一律に四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。

表1 乳歯 う蝕有病者数

年齢	被検査者数	う歯のない者(人)	う歯のある人(人)				計	う歯のない者(%)	う歯のある人(%)			
			計	処置完了者	処置歯・未処置歯併有者	未処置者			計	処置完了者	処置歯・未処置歯併有者	未処置者
男女計	61	46	15	9	3	3	100.0	75.4	24.6	14.8	4.9	4.9
男女	1	4	4				100.0	100.0				
	2	4	4				100.0	100.0				
	3	2	1	1	1		100.0	50.0	50.0	50.0		
	4	5	4	1	1		100.0	80.0	20.0	20.0		
	5	2	1	1		1	100.0	50.0	50.0			50.0
	6	5	4	1	1		100.0	80.0	20.0		20.0	
	7	9	5	4	3	1	100.0	55.6	44.4	33.3	11.1	
	8	5	5				100.0	100.0				
	9	3	1	2	1	1	100.0	33.3	66.7	33.3		33.3
	10	2	2				100.0	100.0				
	11	4	2	2	1	1	100.0	50.0	50.0	25.0	25.0	
	12	7	4	3	2	1	100.0	57.1	42.9	28.6		14.3
	13	3	3				100.0	100.0				
	14	6	6				100.0	100.0				
男性計	32	21	11	5	3	3	100.0	65.6	34.4	15.6	9.4	9.4
男性	1	2	2				100.0	100.0				
	2											
	3	1	1				100.0	100.0				
	4	5	4	1	1		100.0	80.0	20.0	20.0		
	5	2	1	1		1	100.0	50.0	50.0			50.0
	6	2	1	1	1		100.0	50.0	50.0		50.0	
	7	3	1	2	1	1	100.0	33.3	66.7	33.3	33.3	
	8	2	2				100.0	100.0				
	9	3	1	2	1	1	100.0	33.3	66.7	33.3		33.3
	10	2	2				100.0	100.0				
	11	3	1	2	1	1	100.0	33.3	66.7	33.3	33.3	
	12	4	2	2	1	1	100.0	50.0	50.0	25.0		25.0
	13	1	1				100.0	100.0				
	14	2	2				100.0	100.0				
女性計	29	25	4	4			100.0	86.2	13.8	13.8		
女性	1	2	2				100.0	100.0				
	2	4	4				100.0	100.0				
	3	1		1	1		100.0		100.0	100.0		
	4											
	5											
	6	3	3				100.0	100.0				
	7	6	4	2	2		100.0	66.7	33.3	33.3		
	8	3	3				100.0	100.0				
	9											
	10											
	11	1	1				100.0	100.0				
	12	3	2	1	1		100.0	66.7	33.3	33.3		
	13	2	2				100.0	100.0				
	14	4	4				100.0	100.0				

表2 乳歯 現在歯数

(本)

年齢		被検査者数	現在歯数	健全歯数	う歯数	未処置歯数	処置歯数
男女計		61	662	622	40	8	32
男女	1	4	52	52			
	2	4	71	71			
	3	2	40	39	1		1
	4	5	100	99	1		1
	5	2	39	38	1	1	
	6	5	87	84	3	2	1
	7	9	130	106	24	2	22
	8	5	68	68			
	9	3	35	32	3	1	2
	10	2	21	21			
	11	4	8	4	4	1	3
	12	7	9	6	3	1	2
	13	3	2	2			
	14	6					
男性計		32	356	330	26	8	18
男性	1	2	28	28			
	2						
	3	1	20	20			
	4	5	100	99	1		1
	5	2	39	38	1	1	
	6	2	31	28	3	2	1
	7	3	37	25	12	2	10
	8	2	32	32			
	9	3	35	32	3	1	2
	10	2	21	21			
	11	3	8	4	4	1	3
	12	4	5	3	2	1	1
	13	1					
	14	2					
女性計		29	306	292	14		14
女性	1	2	24	24			
	2	4	71	71			
	3	1	20	19	1		1
	4						
	5						
	6	3	56	56			
	7	6	93	81	12		12
	8	3	36	36			
	9						
	10						
	11	1					
	12	3	4	3	1		1
	13	2	2	2			
	14	4					

表3 乳歯 1人平均現在歯数

(本)

年齢		被検査者数	現在歯数	健全歯数	う歯数	未処置歯数	処置歯数
男女計		61	10.9	10.2	0.7	0.1	0.5
男女	1	4	13.0	13.0			
	2	4	17.8	17.8			
	3	2	20.0	19.5	0.5		0.5
	4	5	20.0	19.8	0.2		0.2
	5	2	19.5	19.0	0.5	0.5	
	6	5	17.4	16.8	0.6	0.4	0.2
	7	9	14.4	11.8	2.7	0.2	2.4
	8	5	13.6	13.6			
	9	3	11.7	10.7	1.0	0.3	0.7
	10	2	10.5	10.5			
	11	4	2.0	1.0	1.0	0.3	0.8
	12	7	1.3	0.9	0.4	0.1	0.3
	13	3	0.7	0.7			
	14	6					
男性計		32	11.1	10.3	0.8	0.3	0.6
男性	1	2	14.0	14.0			
	2						
	3	1	20.0	20.0			
	4	5	20.0	19.8	0.2		0.2
	5	2	19.5	19.0	0.5	0.5	
	6	2	15.5	14.0	1.5	1.0	0.5
	7	3	12.3	8.3	4.0	0.7	3.3
	8	2	16.0	16.0			
	9	3	11.7	10.7	1.0	0.3	0.7
	10	2	10.5	10.5			
	11	3	2.7	1.3	1.3	0.3	1.0
	12	4	1.3	0.8	0.5	0.3	0.3
	13	1					
	14	2					
女性計		29	10.6	10.1	0.5		0.5
女性	1	2	12.0	12.0			
	2	4	17.8	17.8			
	3	1	20.0	19.0	1.0		1.0
	4						
	5						
	6	3	18.7	18.7			
	7	6	15.5	13.5	2.0		2.0
	8	3	12.0	12.0			
	9						
	10						
	11	1					
	12	3	1.3	1.0	0.3		0.3
	13	2	1.0	1.0			
	14	4					

表4 乳歯 う歯の状況

年齢		被検査者数	う歯のない者 (人)	う歯のある人(人)					計	う歯のない者 (人)	う歯のある人(%)				
				計	A型	B型	C1型	C2型			計	A型	B型	C1型	C2型
男女計		15	14	1	1				100.0	93.3	6.7	6.7			
男女	1	4	4						100.0	100.0					
	2	4	4						100.0	100.0					
	3	2	1	1	1				100.0	50.0	50.0	50.0			
	4	5	5						100.0	100.0					
男性計		8	8						100.0	100.0					
男性	1	2	2						100.0	100.0					
	2														
	3	1	1						100.0	100.0					
	4	5	5						100.0	100.0					
女性計		7	6	1	1				100.0	85.7	14.3	14.3			
女性	1	2	2						100.0	100.0					
	2	4	4						100.0	100.0					
	3	1		1	1				100.0		100.0	100.0			
	4														

表5 永久歯 う蝕有病者数

年齢	被検査者数	う歯のない者(人)	う歯のある者(人)					計	う歯のない者(%)	う歯のある者(%)				
			計	処置完了者	処置歯・未処置歯併有者	未処置者	処置状況不詳者			計	処置完了者	処置歯・未処置歯併有者	未処置者	処置状況不詳者
男女計	513	101	412	241	129	11	31	100.0	19.7	80.3	47.0	25.1	2.1	6.0
男女	5～9	24	22	2	1	1		100.0	91.7	8.3		4.2	4.2	
	10～14	22	16	6	3	2	1	100.0	72.7	27.3	13.6	9.1	4.5	
	15～19	10	3	7	4	3		100.0	30.0	70.0	40.0	30.0		
	20～24	5	1	4	2	2		100.0	20.0	80.0	40.0	40.0		
	25～29	8		8	3	4	1	100.0		100.0	37.5	50.0	12.5	
	30～34	24	3	21	9	8	2	100.0	12.5	87.5	37.5	33.3	8.3	8.3
	35～39	28		28	19	8	1	100.0		100.0	67.9	28.6		3.6
	40～44	20	3	17	10	6	1	100.0	15.0	85.0	50.0	30.0		5.0
	45～49	20	1	19	10	9		100.0	5.0	95.0	50.0	45.0		
	50～54	20		20	10	7	3	100.0		100.0	50.0	35.0		15.0
	55～59	15		15	13	1	1	100.0		100.0	86.7	6.7		6.7
	60～64	42	4	38	16	18	1	100.0	9.5	90.5	38.1	42.9	2.4	7.1
	65～69	66	5	61	40	17	4	100.0	7.6	92.4	60.6	25.8		6.1
	70～74	79	14	65	39	16	1	9	100.0	17.7	82.3	49.4	20.3	11.4
	75～79	61	9	52	35	12	1	4	100.0	14.8	85.2	57.4	19.7	6.6
	80～84	42	10	32	18	10	1	3	100.0	23.8	76.2	42.9	23.8	7.1
	85～89	22	7	15	8	5	2		100.0	31.8	68.2	36.4	22.7	9.1
	90～	5	3	2	2			100.0	60.0	40.0	40.0			
男性計	197	45	152	84	51	7	10	100.0	22.8	77.2	42.6	25.9	3.6	5.1
男性	5～9	12	11	1			1	100.0	91.7	8.3			8.3	
	10～14	12	7	5	2	2	1	100.0	58.3	41.7	16.7	16.7	8.3	
	15～19	6	1	5	4	1		100.0	16.7	83.3	66.7	16.7		
	20～24	1	1					100.0	100.0					
	25～29	5		5	1	3	1	100.0		100.0	20.0	60.0	20.0	
	30～34	7	1	6	2	2	1	100.0	14.3	85.7	28.6	28.6	14.3	14.3
	35～39	7		7	7			100.0		100.0	100.0			
	40～44	7	2	5	2	3		100.0	28.6	71.4	28.6	42.9		
	45～49	7	1	6	3	3		100.0	14.3	85.7	42.9	42.9		
	50～54	8		8	4	3	1	100.0		100.0	50.0	37.5		12.5
	55～59	5		5	5			100.0		100.0	100.0			
	60～64	17	3	14	5	8	1	100.0	17.6	82.4	29.4	47.1	5.9	
	65～69	25	4	21	14	7		100.0	16.0	84.0	56.0	28.0		
	70～74	25	6	19	8	7	1	3	100.0	24.0	76.0	32.0	28.0	12.0
	75～79	22	3	19	14	3	2	100.0	13.6	86.4	63.6	13.6		9.1
	80～84	23	4	19	9	6	1	3	100.0	17.4	82.6	39.1	26.1	13.0
	85～89	8	1	7	4	3		100.0	12.5	87.5	50.0	37.5		
	90～													
女性計	316	56	260	157	78	4	21	100.0	17.7	82.3	49.7	24.7	1.3	6.6
女性	5～9	12	11	1		1		100.0	91.7	8.3		8.3		
	10～14	10	9	1	1			100.0	90.0	10.0	10.0			
	15～19	4	2	2		2		100.0	50.0	50.0		50.0		
	20～24	4		4	2	2		100.0		100.0	50.0	50.0		
	25～29	3		3	2	1		100.0		100.0	66.7	33.3		
	30～34	17	2	15	7	6	1	1	100.0	11.8	88.2	41.2	35.3	5.9
	35～39	21		21	12	8	1	100.0		100.0	57.1	38.1		4.8
	40～44	13	1	12	8	3	1	100.0	7.7	92.3	61.5	23.1		7.7
	45～49	13		13	7	6		100.0		100.0	53.8	46.2		
	50～54	12		12	6	4	2	100.0		100.0	50.0	33.3		16.7
	55～59	10		10	8	1	1	100.0		100.0	80.0	10.0		10.0
	60～64	25	1	24	11	10	3	100.0	4.0	96.0	44.0	40.0		12.0
	65～69	41	1	40	26	10	4	100.0	2.4	97.6	63.4	24.4		9.8
	70～74	54	8	46	31	9	6	100.0	14.8	85.2	57.4	16.7		11.1
	75～79	39	6	33	21	9	1	2	100.0	15.4	84.6	53.8	23.1	5.1
	80～84	19	6	13	9	4		100.0	31.6	68.4	47.4	21.1		
	85～89	14	6	8	4	2	2	100.0	42.9	57.1	28.6	14.3	14.3	
	90～	5	3	2	2			100.0	60.0	40.0	40.0			

表6 永久歯 現在歯数及び喪失歯数

(本)

年齢	被検査者数	現在歯数	健全歯数	う歯数				喪失歯数	状況不詳歯数
					未処置歯数	処置歯数	処置状況不詳歯数		
男女計	513	10,182	5,759	4,423	394	3,746	283	3,561	47
男女	5～9	24	162	156	6	3	3		
	10～14	22	537	526	11	3	8	1	
	15～19	10	281	255	26	9	17		
	20～24	5	142	119	23	3	20		
	25～29	8	236	175	61	18	43		
	30～34	24	686	503	183	27	129	27	10
	35～39	28	772	452	320	18	302	9	3
	40～44	20	558	377	181	12	153	16	13
	45～49	20	515	235	280	17	263	48	
	50～54	20	503	256	247	20	199	28	41
	55～59	15	351	167	184	3	181	45	1
	60～64	42	912	468	444	49	375	20	251
	65～69	66	1,398	687	711	37	624	50	479
	70～74	79	1,403	697	706	62	562	82	775
	75～79	61	1,015	400	615	45	528	42	712
	80～84	42	485	211	274	32	224	18	639
	85～89	22	201	71	130	36	94	421	
	90～	5	25	4	21		21	117	
	(再掲) 20								
	〃 30	7	208	150	58	10	48	1	
	〃 40	4	115	97	18	1	17		
	〃 50	1	28	9	19	2	17		
	〃 60	8	187	90	97	17	80	40	
	〃 70	11	204	109	95	3	52	109	
	〃 80	12	156	79	77	2	75	181	
男性計	197	3,826	2,331	1,495	161	1,262	72	1,353	43
男性	5～9	12	77	75	2	2			
	10～14	12	275	266	9	3	6	1	
	15～19	6	168	153	15	2	13		
	20～24	1	29	29	0				
	25～29	5	148	110	38	15	23		
	30～34	7	197	151	46	10	26	10	6
	35～39	7	193	125	68		68	6	
	40～44	7	196	141	55	7	48	5	
	45～49	7	157	62	95	6	89	40	
	50～54	8	208	94	114	10	91	13	22
	55～59	5	132	67	65		65	11	1
	60～64	17	345	188	157	22	135	138	3
	65～69	25	516	290	226	23	203	203	
	70～74	25	403	232	171	26	136	9	253
	75～79	22	386	169	217	6	189	22	243
	80～84	23	302	146	156	19	119	18	290
	85～89	8	94	33	61	10	51	135	
	90～								
女性計	316	6,356	3,428	2,928	233	2,484	211	2,208	4
女性	5～9	12	85	81	4	1	3		
	10～14	10	262	260	2		2		
	15～19	4	113	102	11	7	4		
	20～24	4	113	90	23	3	20		
	25～29	3	88	65	23	3	20		
	30～34	17	489	352	137	17	103	17	4
	35～39	21	579	327	252	18	234	3	3
	40～44	13	362	236	126	5	105	16	8
	45～49	13	358	173	185	11	174	8	
	50～54	12	295	162	133	10	108	15	19
	55～59	10	219	100	119	3	116	34	
	60～64	25	567	280	287	27	240	20	113
	65～69	41	882	397	485	14	421	50	276
	70～74	54	1,000	465	535	36	426	73	522
	75～79	39	629	231	398	39	339	20	469
	80～84	19	183	65	118	13	105	349	
	85～89	14	107	38	69	26	43	286	
	90～	5	25	4	21		21	117	

注) 処置状況不詳歯とは、架工義歯(Br)の支台であり、処置状況(う蝕あり:C、充填歯:F、クラウン:Kの別)が不詳である歯のこと。

表7 永久歯 1人平均現在歯数及び喪失歯数

(本)

年齢	被検査者数	現在歯数	健全歯数	DMFT	う歯数			喪失歯数
						未処置歯数	処置歯数	
男女計	513	20.2	11.4	15.6	8.8	0.8	7.8	7.1
男女	5～9	24	6.8	6.5	0.3	0.3	0.1	0.1
	10～14	22	24.4	23.9	0.5	0.5	0.1	0.4
	15～19	10	28.1	25.5	2.6	2.6	0.9	1.7
	20～24	5	28.4	23.8	4.6	4.6	0.6	4.0
	25～29	8	29.5	21.9	7.6	7.6	2.3	5.4
	30～34	24	28.6	21.0	7.5	7.6	1.2	5.9
	35～39	28	28.6	16.7	12.2	11.9	0.7	11.2
	40～44	20	27.9	18.9	9.3	9.1	0.6	8.1
	45～49	20	25.8	11.8	16.4	14.0	0.9	13.2
	50～54	20	26.5	13.5	14.9	13.0	1.2	11.7
	55～59	15	25.1	11.9	16.4	13.1	0.2	12.9
	60～64	42	22.2	11.4	17.0	10.8	1.3	9.6
	65～69	66	21.2	10.4	17.9	10.8	0.6	10.1
	70～74	79	18.2	9.1	19.4	9.2	0.9	8.0
	75～79	61	16.6	6.6	21.5	10.1	0.8	9.3
	80～84	42	12.1	5.3	22.9	6.9	0.8	5.7
	85～89	22	9.1	3.2	25.0	5.9	1.6	4.3
	90～	5	5.0	0.8	27.6	4.2	4.2	23.4
男性計	197	19.8	12.1	14.6	7.7	0.9	6.7	7.0
男性	5～9	12	6.4	6.3	0.2	0.2	0.2	
	10～14	12	22.9	22.2	0.8	0.8	0.3	0.1
	15～19	6	28.0	25.5	2.5	2.5	0.3	2.2
	20～24	1	29.0	29.0				
	25～29	5	29.6	22.0	7.6	7.6	3.0	4.6
	30～34	7	28.1	21.6	6.8	6.6	1.7	4.3
	35～39	7	27.6	17.9	10.6	9.7	9.7	0.9
	40～44	7	28.0	20.1	8.6	7.9	1.0	6.9
	45～49	7	22.4	8.9	19.3	13.6	0.9	12.7
	50～54	8	26.0	11.8	17.0	14.3	1.4	13.0
	55～59	5	26.4	13.4	15.2	13.0	13.0	2.2
	60～64	17	20.3	11.1	17.4	9.2	1.3	7.9
	65～69	25	20.6	11.6	17.2	9.0	0.9	8.1
	70～74	25	17.5	10.1	18.8	7.4	1.2	6.2
	75～79	22	17.5	7.7	20.4	9.9	0.3	9.5
	80～84	23	14.4	7.0	21.3	7.4	1.0	6.0
	85～89	8	11.8	4.1	24.5	7.6	1.3	6.4
	90～							
女性計	316	20.4	11.0	16.3	9.4	0.8	8.4	7.1
女性	5～9	12	7.1	6.8	0.3	0.3	0.1	0.3
	10～14	10	26.2	26.0	0.2	0.2	0.2	
	15～19	4	28.3	25.5	2.8	2.8	1.8	1.0
	20～24	4	28.3	22.5	5.8	5.8	0.8	5.0
	25～29	3	29.3	21.7	7.7	7.7	1.0	6.7
	30～34	17	28.8	20.7	7.7	8.1	1.1	6.4
	35～39	21	29.0	16.4	12.8	12.6	0.9	11.7
	40～44	13	27.8	18.2	9.8	9.7	0.4	8.8
	45～49	13	27.5	13.3	14.8	14.2	0.8	13.4
	50～54	12	26.8	14.7	13.5	12.1	1.0	10.8
	55～59	10	24.3	11.1	17.0	13.2	0.3	12.9
	60～64	25	23.6	11.7	16.7	12.0	1.2	10.9
	65～69	41	21.5	9.7	18.4	11.8	0.4	11.4
	70～74	54	18.5	8.6	19.6	9.9	0.8	8.9
	75～79	39	16.1	5.9	22.1	10.2	1.1	9.2
	80～84	19	9.6	3.4	24.6	6.2	0.7	5.5
	85～89	14	7.6	2.7	25.4	4.9	1.9	3.1
	90～	5	5.0	0.8	27.6	4.2	4.2	23.4

注) 平均値は、各々の状況不詳者の回答者数を除いて算出したものであるため、被検査者数で除した数値とは異なる。

また、う歯数計は 46 ページで算出した処置状況不詳歯数も含まれるため、未処置歯数と処置歯数の合計とは一致しない。

表8 喪失歯のある者の数

(人)

年齢	被検査者数	喪失歯のない者	計	喪失歯のある者												
				1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本
男女計	513	167	345	49	30	31	27	17	17	7	8	9	9	13	9	3
男女	5～9	24	24													
	10～14	22	21	1	1											
	15～19	10	10													
	20～24	5	5													
	25～29	8	8													
	30～34	24	16	8	7		1									
	35～39	28	22	5	1	4										
	40～44	20	14	6	3		2	1								
	45～49	20	10	6		1		1	1							
	50～54	20	7	13	2	3	3	1	1	1		1				
	55～59	15	4	11	3	2		2	1						1	1
	60～64	42	6	36	4	4	3	6	2	3	2	1	1	2		
	65～69	66	6	60	9	8	9	5	4	2		2	1	4	1	2
	70～74	79	6	73	5	4	10	8	4	4	2	2	1	2	4	1
	75～79	61	5	56	6	3		3	4	2	2	3	3		3	3
	80～84	42	2	40	1	2	1	1		2	1		2	2	2	3
	85～89	22	1	21	1		1			1					1	
	90～	5		5						1						
男性計	197	63	134	23	13	9	10	8	8	3	1	2	2	4	1	1
男性	5～9	12	12													
	10～14	12	11	1	1											
	15～19	6	6													
	20～24	1	1													
	25～29	5	5													
	30～34	7	3	4	3		1									
	35～39	7	4	3		3										
	40～44	7	4	3	2		1									
	45～49	7	3	4	1				1	1						
	50～54	8	4	4			1	1		1			1			
	55～59	5	1	4	1	1		2								
	60～64	17	1	16	2	1	2	2	2	1	1				1	
	65～69	25	3	22	7	3	1	1	1	1						
	70～74	25	1	24	3	3	3	1	1	2						1
	75～79	22	1	21	3			3	3		1	1			1	
	80～84	23	2	21		2				2	1		1	2	1	1
	85～89	8	1	7											1	
	90～															
女性計	316	104	211	26	17	22	17	9	9	4	7	7	7	9	8	2
女性	5～9	12	12													
	10～14	10	10													
	15～19	4	4													
	20～24	4	4													
	25～29	3	3													
	30～34	17	13	4	4											
	35～39	21	18	2	1	1										
	40～44	13	10	3	1		1	1								
	45～49	13	7	6	5		1									
	50～54	12	3	9	2	3	2		1							
	55～59	10	3	7	2	1		1							1	1
	60～64	25	5	20	2	3	1	4		2	1	1	1	1	1	
	65～69	41	3	38	2	5	8	4	3	1		2	1	4	1	2
	70～74	54	5	49	2	1	7	7	3	2	2	2	1	2	4	
	75～79	39	4	35	3	3			1	2	1	2	3		2	3
	80～84	19		19	1		1	1					1		1	2
	85～89	14		14	1		1			1						
	90～	5		5						1						

表8(つづき)喪失歯のある者の数

(人)

年齢		喪失歯のある者															不詳	
		14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本		本数 不詳
男女計		11	5	6	7	5	2	4	1	3	8	3	3	2	4	45	7	1
男 女	5～9																	
	10～14																	
	15～19																	
	20～24																	
	25～29																	
	30～34																	
	35～39																	1
	40～44																	
	45～49															1		
	50～54																1	
	55～59																1	
	60～64	1	3													2	1	
	65～69	4		2							1	1				5		
	70～74	1	2	2	2	3					3				1	10	2	
	75～79	4		2	3		1	1			3		1	1		8		
	80～84				1		1	2		2		1	2	1	1	9	2	
	85～89	1			1	2		1	1	1	1	1			1	7		
90～														1	3			
男性計		5	2	4	4	1	2	2		1			1	2	2	19	4	
男 性	5～9																	
	10～14																	
	15～19																	
	20～24																	
	25～29																	
	30～34																	
	35～39																	
	40～44																	
	45～49															1		
	50～54																	
	55～59																	
	60～64		2													2		
	65～69	2		2												4		
	70～74			1	1											6	2	
	75～79	2		1	1		1					1	1			2		
	80～84				1		1	1		1			1	1	1	3	2	
	85～89	1			1	1		1						1	1	1		
90～																		
女性計		6	3	2	3	4		2	1	2	8	3	2		2	26	3	1
女 性	5～9																	
	10～14																	
	15～19																	
	20～24																	
	25～29																	
	30～34																	
	35～39																	1
	40～44																	
	45～49																	
	50～54																1	
	55～59																1	
	60～64	1	1														1	
	65～69	2									1	1				1		
	70～74	1	2	1	1	3					3				1	4		
	75～79	2		1	2			1			3					6		
	80～84							1		1		1	2			6		
	85～89					1			1	1	1	1				6		
90～														1	3			

表9 永久歯 現在歯数 20 本以上の者

(人)

年齢	被検査者数	20本以上保有者	第一第臼歯保有者			
			1本	2本	3本	4本
男女計	457	298	39	63	55	204
男女	20～24	5	5			5
	25～29	8	8			8
	30～34	24	24		1	23
	35～39	28	27		1	26
	40～44	20	20		1	19
	45～49	20	19	1	1	17
	50～54	20	18	2	2	12
	55～59	15	12	2	4	9
	60～64	42	31	4	13	14
	65～69	66	45	8	13	23
	70～74	79	45	7	13	20
	75～79	61	29	7	8	20
	80～84	42	10	4	8	6
	85～89	22	4	5	1	2
	90～	5	1		1	
男性計	167	108	12	24	17	76
男性	20～24	1	1			1
	25～29	5	5			5
	30～34	7	7			7
	35～39	7	7		1	6
	40～44	7	7		1	6
	45～49	7	6	1		5
	50～54	8	7	2	1	4
	55～59	5	5		2	3
	60～64	17	12	1	6	4
	65～69	25	17	2	4	11
	70～74	25	14		1	8
	75～79	22	12	1	3	10
	80～84	23	7	3	6	5
	85～89	8	1	3		1
	90～					
女性計	290	190	27	39	38	128
女性	20～24	4	4			4
	25～29	3	3			3
	30～34	17	17		1	16
	35～39	21	20			20
	40～44	13	13			13
	45～49	13	13		1	12
	50～54	12	11	1	2	8
	55～59	10	7	2	2	6
	60～64	25	19	3	7	10
	65～69	41	28	6	9	12
	70～74	54	31	7	12	12
	75～79	39	17	6	5	10
	80～84	19	3	1	2	1
	85～89	14	3	2	1	1
	90～	5	1		1	

表 10 永久歯 補綴の状況

(人)

年齢	被検査者数	補綴状況						喪失歯なし	喪失歯 有無不詳
		計	完了	一部 未処置	未処置	不要	補綴状況 不詳		
男女計	467	344	218	54	33	22	17	122	1
男 女	15～19	10						10	
	20～24	5						5	
	25～29	8						8	
	30～34	24	8	4		4		16	
	35～39	28	5	1	1	2	1	22	1
	40～44	20	6	2	1	2		14	
	45～49	20	10	5	2	1		10	
	50～54	20	13	5	2	3	2	7	
	55～59	15	11	6	1	1	3	4	
	60～64	42	36	16	8	10	2	6	
	65～69	66	60	39	10	5	4	6	
	70～74	79	73	50	14	5	2	6	
	75～79	61	56	39	7	5	3	5	
	80～84	42	40	29	5	3	3	2	
	85～89	22	21	17	3	1		1	
	90～	5	5	5					
男性計	173	133	81	18	17	9	8	40	
男 性	15～19	6						6	
	20～24	1						1	
	25～29	5						5	
	30～34	7	4	2		2		3	
	35～39	7	3		1	1	1	4	
	40～44	7	3	1	1	1		4	
	45～49	7	4	2	1	1		3	
	50～54	8	4	3			1	4	
	55～59	5	4	1	1	1	1	1	
	60～64	17	16	6	3	7		1	
	65～69	25	22	14	3	3	2	3	
	70～74	25	24	17	1	3	1	2	1
	75～79	22	21	16	3		1	1	
	80～84	23	21	13	3	3	2	2	
	85～89	8	7	6	1			1	
	90～								
女性計	294	211	137	36	16	13	9	82	1
女 性	15～19	4						4	
	20～24	4						4	
	25～29	3						3	
	30～34	17	4	2		2		13	
	35～39	21	2	1		1		18	1
	40～44	13	3	1	1	1		10	
	45～49	13	6	3	1	1		7	
	50～54	12	9	2	2	3	1	3	
	55～59	10	7	5			2	3	
	60～64	25	20	10	5	3	2	5	
	65～69	41	38	25	7	2	2	3	
	70～74	54	49	33	13	2	1	5	
	75～79	39	35	23	4	5	1	4	
	80～84	19	19	16	2		1		
	85～89	14	14	11	2	1			
	90～	5	5	5					

表 11 永久歯 補綴物の状況(補綴の種類)

(複数回答)

(人)

年齢	被検査者数	架工義歯	部分床義歯	全部床義歯	インプラント	不詳
男女計	272	143	113	65	4	14
男 女	15～19					
	20～24					
	25～29					
	30～34	4	4			
	35～39	2	1			1
	40～44	3	3			
	45～49	7	6			1
	50～54	7	6			1
	55～59	7	5	2		
	60～64	24	14	10	2	3
	65～69	49	33	21	5	1
	70～74	64	39	25	13	1
	75～79	46	20	25	12	3
	80～84	34	8	19	17	2
	85～89	20	3	10	12	1
	90～	5	1	1	4	
男性計	99	43	41	27	1	6
男 性	15～19					
	20～24					
	25～29					
	30～34	2	2			
	35～39	1				1
	40～44	2	2			
	45～49	3	3			
	50～54	3	2			1
	55～59	2	1	1		
	60～64	9	4	2	2	2
	65～69	17	8	7	4	1
	70～74	18	8	5	7	
	75～79	19	7	10	5	1
	80～84	16	4	11	7	
	85～89	7	2	5	2	1
	90～					
女性計	173	100	72	38	3	8
女 性	15～19					
	20～24					
	25～29					
	30～34	2	2			
	35～39	1	1			
	40～44	1	1			
	45～49	4	3			1
	50～54	4	4			
	55～59	5	4	1		
	60～64	15	10	8		1
	65～69	32	25	14	1	1
	70～74	46	31	20	6	1
	75～79	27	13	15	7	2
	80～84	18	4	8	10	2
	85～89	13	1	5	10	
	90～	5	1	1	4	

表 12 歯肉の所見の状況(歯肉出血・5歳以上)

年齢	被検査者数	所見の状況(人)					計	所見の状況(%)				
		所見のない者	ブローピング後の出血	除外歯	対象歯のない者	不詳		所見のない者	ブローピング後の出血	除外歯	対象歯のない者	不詳
男女計	513	289	159	3	60	2	100.0	56.3	31.0	0.6	11.7	0.4
男女	5～9	24	17	5	2		100.0	70.8	20.8		8.3	
	10～14	22	18	4			100.0	81.8	18.2			
	15～19	10	8	2			100.0	80.0	20.0			
	20～24	5	3	2			100.0	60.0	40.0			
	25～29	8	5	3			100.0	62.5	37.5			
	30～34	24	18	6			100.0	75.0	25.0			
	35～39	28	21	7			100.0	75.0	25.0			
	40～44	20	16	4			100.0	80.0	20.0			
	45～49	20	12	7	1		100.0	60.0	35.0		5.0	
	50～54	20	16	4			100.0	80.0	20.0			
	55～59	15	11	4			100.0	73.3	26.7			
	60～64	42	24	16	2		100.0	57.1	38.1		4.8	
	65～69	66	38	22	4		100.0	57.6	33.3	3.0	6.1	
	70～74	79	38	28	12	1	100.0	48.1	35.4		15.2	1.3
	75～79	61	23	24	13	1	100.0	37.7	39.3		21.3	1.6
	80～84	42	15	14	13		100.0	35.7	33.3		31.0	
	85～89	22	5	7	9		100.0	22.7	31.8	4.5	40.9	
	90～	5	1		4		100.0	20.0			80.0	
男性計	197	111	61	1	24		100.0	56.3	31.0	0.5	12.2	
男性	5～9	12	10	1	1		100.0	83.3	8.3		8.3	
	10～14	12	10	2			100.0	83.3	16.7			
	15～19	6	5	1			100.0	83.3	16.7			
	20～24	1	1				100.0	100.0				
	25～29	5	2	3			100.0	40.0	60.0			
	30～34	7	4	3			100.0	57.1	42.9			
	35～39	7	6	1			100.0	85.7	14.3			
	40～44	7	3	4			100.0	42.9	57.1			
	45～49	7	5	1	1		100.0	71.4	14.3		14.3	
	50～54	8	6	2			100.0	75.0	25.0			
	55～59	5	4	1			100.0	80.0	20.0			
	60～64	17	9	6	2		100.0	52.9	35.3		11.8	
	65～69	25	12	9	3	1	100.0	48.0	36.0	4.0	12.0	
	70～74	25	11	8	6		100.0	44.0	32.0		24.0	
	75～79	22	9	9	4		100.0	40.9	40.9		18.2	
	80～84	23	10	8	5		100.0	43.5	34.8		21.7	
	85～89	8	4	2	2		100.0	50.0	25.0		25.0	
	90～											
女性計	316	178	98	2	36	2	100.0	56.3	31.0	0.6	11.4	0.6
女性	5～9	12	7	4	1		100.0	58.3	33.3		8.3	
	10～14	10	8	2			100.0	80.0	20.0			
	15～19	4	3	1			100.0	75.0	25.0			
	20～24	4	2	2			100.0	50.0	50.0			
	25～29	3	3				100.0	100.0				
	30～34	17	14	3			100.0	82.4	17.6			
	35～39	21	15	6			100.0	71.4	28.6			
	40～44	13	13				100.0	100.0				
	45～49	13	7	6			100.0	53.8	46.2			
	50～54	12	10	2			100.0	83.3	16.7			
	55～59	10	7	3			100.0	70.0	30.0			
	60～64	25	15	10			100.0	60.0	40.0			
	65～69	41	26	13	1		100.0	63.4	31.7	2.4	2.4	
	70～74	54	27	20	6	1	100.0	50.0	37.0		11.1	1.9
	75～79	39	14	15	9	1	100.0	35.9	38.5		23.1	2.6
	80～84	19	5	6	8		100.0	26.3	31.6		42.1	
	85～89	14	1	5	7	1	100.0	7.1	35.7	7.1	50.0	
	90～	5	1		4		100.0	20.0			80.0	

表 12 歯肉の所見の状況(歯周ポケット・15 歳以上)

年齢	被検査者数	所見の状況(人)						計	所見の状況(%)					
		所見のない者	ポケットの深さが4～6mm未満	ポケットの深さが6mm以上	除外歯	対象歯のない者	不詳		所見のない者	ポケットの深さが4～6mm未満	ポケットの深さが6mm以上	除外歯	対象歯のない者	不詳
男女計	467	192	151	61	3	58	2	100.0	41.1	32.3	13.1	0.6	12.4	0.4
男 女	15～19	10	9	1				100.0	90.0	10.0				
	20～24	5	3	2				100.0	60.0	40.0				
	25～29	8	5	3				100.0	62.5	37.5				
	30～34	24	16	8				100.0	66.7	33.3				
	35～39	28	22	6				100.0	78.6	21.4				
	40～44	20	11	7	2			100.0	55.0	35.0	10.0			
	45～49	20	8	9	1	1	1	100.0	40.0	45.0	5.0		5.0	5.0
	50～54	20	13	3	4			100.0	65.0	15.0	20.0			
	55～59	15	6	3	6			100.0	40.0	20.0	40.0			
	60～64	42	14	23	3	2		100.0	33.3	54.8	7.1		4.8	
	65～69	66	29	22	9	4		100.0	43.9	33.3	13.6	3.0	6.1	
	70～74	79	22	31	14	12		100.0	27.8	39.2	17.7		15.2	
	75～79	61	16	17	14	13	1	100.0	26.2	27.9	23.0		21.3	1.6
	80～84	42	11	12	6	13		100.0	26.2	28.6	14.3		31.0	
	85～89	22	6	4	2	9		100.0	27.3	18.2	9.1	4.5	40.9	
	90～	5	1			4		100.0	20.0				80.0	
男性計	173	67	59	22	1	23	1	100.0	38.7	34.1	12.7	0.6	13.3	0.6
男 性	15～19	6	5	1				100.0	83.3	16.7				
	20～24	1	1					100.0	100.0					
	25～29	5	3	2				100.0	60.0	40.0				
	30～34	7	3	4				100.0	42.9	57.1				
	35～39	7	6	1				100.0	85.7	14.3				
	40～44	7	3	3	1			100.0	42.9	42.9	14.3			
	45～49	7	2	3		1	1	100.0	28.6	42.9			14.3	14.3
	50～54	8	4	1	3			100.0	50.0	12.5	37.5			
	55～59	5	2	1	2			100.0	40.0	20.0	40.0			
	60～64	17	4	10	1	2		100.0	23.5	58.8	5.9		11.8	
	65～69	25	12	7	2	3	1	100.0	48.0	28.0	8.0	4.0	12.0	
	70～74	25	6	9	4	6		100.0	24.0	36.0	16.0		24.0	
	75～79	22	6	8	4	4		100.0	27.3	36.4	18.2		18.2	
	80～84	23	5	8	5	5		100.0	21.7	34.8	21.7		21.7	
	85～89	8	5	1		2		100.0	62.5	12.5			25.0	
	90～													
女性計	294	125	92	39	2	35	1	100.0	42.5	31.3	13.3	0.7	11.9	0.3
女 性	15～19	4	4					100.0	100.0					
	20～24	4	2	2				100.0	50.0	50.0				
	25～29	3	2	1				100.0	66.7	33.3				
	30～34	17	13	4				100.0	76.5	23.5				
	35～39	21	16	5				100.0	76.2	23.8				
	40～44	13	8	4	1			100.0	61.5	30.8	7.7			
	45～49	13	6	6	1			100.0	46.2	46.2	7.7			
	50～54	12	9	2	1			100.0	75.0	16.7	8.3			
	55～59	10	4	2	4			100.0	40.0	20.0	40.0			
	60～64	25	10	13	2			100.0	40.0	52.0	8.0			
	65～69	41	17	15	7	1	1	100.0	41.5	36.6	17.1	2.4	2.4	
	70～74	54	16	22	10	6		100.0	29.6	40.7	18.5		11.1	
	75～79	39	10	9	10	9	1	100.0	25.6	23.1	25.6		23.1	2.6
	80～84	19	6	4	1	8		100.0	31.6	21.1	5.3		42.1	
	85～89	14	1	3	2	7	1	100.0	7.1	21.4	14.3	7.1	50.0	
	90～	5	1			4		100.0	20.0				80.0	

表 13 歯垢、歯石、歯列・咬合不正、顎関節、口腔粘膜等の所見の状況

年齢		被検査者数	その他の所見のある人(人)					計	その他の所見のある人(%)				
			歯垢	歯石	歯列・咬合	顎関節	口腔粘膜		歯垢	歯石	歯列・咬合	顎関節	口腔粘膜
男女計		528	253	199	60	26	4	100.0	47.9	37.7	11.4	4.9	0.8
男女	1～4	15	1		1			100.0	6.7		6.7		
	5～9	24	12	5	4			100.0	50.0	20.8	16.7		
	10～14	22	9	6	1			100.0	40.9	27.3	4.5		
	15～19	10	6	2	2			100.0	60.0	20.0	20.0		
	20～24	5	4	5	3			100.0	80.0	100.0	60.0		
	25～29	8	4	3	2			100.0	50.0	37.5	25.0		
	30～34	24	8	8	1	2		100.0	33.3	33.3	4.2	8.3	
	35～39	28	12	10	1	3		100.0	42.9	35.7	3.6	10.7	
	40～44	20	12	8	6	3		100.0	60.0	40.0	30.0	15.0	
	45～49	20	12	11	4	4		100.0	60.0	55.0	20.0	20.0	
	50～54	20	10	9	3	5		100.0	50.0	45.0	15.0	25.0	
	55～59	15	10	6	2			100.0	66.7	40.0	13.3		
	60～64	42	26	25	7	4		100.0	61.9	59.5	16.7	9.5	
	65～69	66	27	21	7	2	1	100.0	40.9	31.8	10.6	3.0	1.5
	70～74	79	32	27	6		1	100.0	40.5	34.2	7.6		1.3
	75～79	61	34	29	3		1	100.0	55.7	47.5	4.9		1.6
	80～84	42	21	16	3	2	1	100.0	50.0	38.1	7.1	4.8	2.4
	85～89	22	11	7	4			100.0	50.0	31.8	18.2		
90～	5	2	1		1		100.0	40.0	20.0		20.0		
男性計		205	105	80	22	6	2	100.0	51.2	39.0	10.7	2.9	1.0
男性	1～4	8	1					100.0	12.5				
	5～9	12	8	3	2			100.0	66.7	25.0	16.7		
	10～14	12	6	3				100.0	50.0	25.0			
	15～19	6	4	2	2			100.0	66.7	33.3	33.3		
	20～24	1	1	1	1			100.0	100.0	100.0	100.0		
	25～29	5	3	3	1			100.0	60.0	60.0	20.0		
	30～34	7	1	2	1	1		100.0	14.3	28.6	14.3	14.3	
	35～39	7	2	2				100.0	28.6	28.6			
	40～44	7	5	4	3			100.0	71.4	57.1	42.9		
	45～49	7	4	4		1		100.0	57.1	57.1		14.3	
	50～54	8	3	5		2		100.0	37.5	62.5		25.0	
	55～59	5	4					100.0	80.0				
	60～64	17	10	9	3	1		100.0	58.8	52.9	17.6	5.9	
	65～69	25	13	11	2		1	100.0	52.0	44.0	8.0		4.0
	70～74	25	10	10	3			100.0	40.0	40.0	12.0		
	75～79	22	13	10				100.0	59.1	45.5			
	80～84	23	13	9	3	1	1	100.0	56.5	39.1	13.0	4.3	4.3
	85～89	8	4	2	1			100.0	50.0	25.0	12.5		
90～													
女性計		323	148	119	38	20	2	100.0	45.8	36.8	11.8	6.2	0.6
女性	1～4	7			1			100.0			14.3		
	5～9	12	4	2	2			100.0	33.3	16.7	16.7		
	10～14	10	3	3	1			100.0	30.0	30.0	10.0		
	15～19	4	2					100.0	50.0				
	20～24	4	3	4	2			100.0	75.0	100.0	50.0		
	25～29	3	1		1			100.0	33.3		33.3		
	30～34	17	7	6		1		100.0	41.2	35.3		5.9	
	35～39	21	10	8	1	3		100.0	47.6	38.1	4.8	14.3	
	40～44	13	7	4	3	3		100.0	53.8	30.8	23.1	23.1	
	45～49	13	8	7	4	3		100.0	61.5	53.8	30.8	23.1	
	50～54	12	7	4	3	3		100.0	58.3	33.3	25.0	25.0	
	55～59	10	6	6	2			100.0	60.0	60.0	20.0		
	60～64	25	16	16	4	3		100.0	64.0	64.0	16.0	12.0	
	65～69	41	14	10	5	2		100.0	34.1	24.4	12.2	4.9	
	70～74	54	22	17	3		1	100.0	40.7	31.5	5.6		1.9
	75～79	39	21	19	3		1	100.0	53.8	48.7	7.7		2.6
	80～84	19	8	7		1		100.0	42.1	36.8		5.3	
	85～89	14	7	5	3			100.0	50.0	35.7	21.4		
90～	5	2	1		1		100.0	40.0	20.0		20.0		

表 14 歯みがきの状況(あなたは、歯をみがきますか。)

年齢	総数	実数(人)				計	実数(%)			
		毎日みがく	時々みがく	みがかない	不詳		毎日みがく	時々みがく	みがかない	不詳
男女計	1,121	1,049	55	16	1	100.0	93.6	4.9	1.4	0.1
男女	1～4	39	37	2		100.0	94.9	5.1		
	5～9	45	44	1		100.0	97.8	2.2		
	10～14	53	48	5		100.0	90.6	9.4		
	15～19	57	52	5		100.0	91.2	8.8		
	20～24	13	13			100.0	100.0			
	25～29	31	28	3		100.0	90.3	9.7		
	30～34	51	48	3		100.0	94.1	5.9		
	35～39	66	64	2		100.0	97.0	3.0		
	40～44	62	60	2		100.0	96.8	3.2		
	45～49	72	70	1	1	100.0	97.2	1.4	1.4	
	50～54	49	48	1		100.0	98.0	2.0		
	55～59	40	39	1		100.0	97.5	2.5		
	60～64	75	69	6		100.0	92.0	8.0		
	65～69	120	112	7	1	100.0	93.3	5.8	0.8	
	70～74	125	116	4	5	100.0	92.8	3.2	4.0	
	75～79	99	92	5	2	100.0	92.9	5.1	2.0	
	80～84	68	63	3	1	100.0	92.6	4.4	1.5	1.5
	85～89	40	35	2	3	100.0	87.5	5.0	7.5	
	90～	16	11	2	3	100.0	68.8	12.5	18.8	
男性計	499	450	39	9	1	100.0	90.2	7.8	1.8	0.2
男性	1～4	17	17			100.0	100.0			
	5～9	20	19	1		100.0	95.0	5.0		
	10～14	29	27	2		100.0	93.1	6.9		
	15～19	28	25	3		100.0	89.3	10.7		
	20～24	5	5			100.0	100.0			
	25～29	14	11	3		100.0	78.6	21.4		
	30～34	23	21	2		100.0	91.3	8.7		
	35～39	32	30	2		100.0	93.8	6.3		
	40～44	27	26	1		100.0	96.3	3.7		
	45～49	36	34	1	1	100.0	94.4	2.8	2.8	
	50～54	25	24	1		100.0	96.0	4.0		
	55～59	17	16	1		100.0	94.1	5.9		
	60～64	33	29	4		100.0	87.9	12.1		
	65～69	49	41	7	1	100.0	83.7	14.3	2.0	
	70～74	48	43	3	2	100.0	89.6	6.3	4.2	
	75～79	42	38	2	2	100.0	90.5	4.8	4.8	
	80～84	34	30	2	1	100.0	88.2	5.9	2.9	2.9
	85～89	15	12	2	1	100.0	80.0	13.3	6.7	
	90～	5	2	2	1	100.0	40.0	40.0	20.0	
女性計	622	599	16	7		100.0	96.3	2.6	1.1	
女性	1～4	22	20	2		100.0	90.9	9.1		
	5～9	25	25			100.0	100.0			
	10～14	24	21	3		100.0	87.5	12.5		
	15～19	29	27	2		100.0	93.1	6.9		
	20～24	8	8			100.0	100.0			
	25～29	17	17			100.0	100.0			
	30～34	28	27	1		100.0	96.4	3.6		
	35～39	34	34			100.0	100.0			
	40～44	35	34	1		100.0	97.1	2.9		
	45～49	36	36			100.0	100.0			
	50～54	24	24			100.0	100.0			
	55～59	23	23			100.0	100.0			
	60～64	42	40	2		100.0	95.2	4.8		
	65～69	71	71			100.0	100.0			
	70～74	77	73	1	3	100.0	94.8	1.3	3.9	
	75～79	57	54	3		100.0	94.7	5.3		
	80～84	34	33	1		100.0	97.1	2.9		
	85～89	25	23		2	100.0	92.0		8.0	
	90～	11	9		2	100.0	81.8		18.2	

表 15 歯みがき時間帯(いつ歯をみがきますか。)

(複数回答)

年齢	総数	実数(人)								実数(%)							
		起床後	朝食後	昼食後	夕食後	就寝前	間食(おやつ、夜食等)の後	不詳		起床後	朝食後	昼食後	夕食後	就寝前	間食(おやつ、夜食等)の後	不詳	
男女計	1,104	343	690	306	343	636	43	1		31.1	62.5	27.7	31.1	57.6	3.9	0.1	
男 女	1～4	39	7	18	9	14	25	3		17.9	46.2	23.1	35.9	64.1	7.7		
	5～9	45	4	32	17	13	29			8.9	71.1	37.8	28.9	64.4			
	10～14	53	6	39	19	9	35			11.3	73.6	35.8	17.0	66.0			
	15～19	57	14	41	6	8	40	1		24.6	71.9	10.5	14.0	70.2	1.8		
	20～24	13	6	7	1	2	10			46.2	53.8	7.7	15.4	76.9			
	25～29	31	9	17	5	6	24	2		29.0	54.8	16.1	19.4	77.4	6.5		
	30～34	51	18	27	13	16	33	2		35.3	52.9	25.5	31.4	64.7	3.9		
	35～39	66	20	42	15	18	46			30.3	63.6	22.7	27.3	69.7			
	40～44	62	18	41	21	13	40			29.0	66.1	33.9	21.0	64.5			
	45～49	71	25	41	15	13	47	3		35.2	57.7	21.1	18.3	66.2	4.2		
	50～54	49	16	30	16	18	23	3		32.7	61.2	32.7	36.7	46.9	6.1		
	55～59	40	11	28	14	11	26	4		27.5	70.0	35.0	27.5	65.0	10.0		
	60～64	75	24	44	21	26	44	4		32.0	58.7	28.0	34.7	58.7	5.3		
	65～69	119	39	88	35	46	60	6		32.8	73.9	29.4	38.7	50.4	5.0		
	70～74	120	40	79	40	49	57	10		33.3	65.8	33.3	40.8	47.5	8.3		
	75～79	97	37	60	28	41	39	1	1	38.1	61.9	28.9	42.3	40.2	1.0	1.0	
	80～84	66	27	36	16	21	35	3		40.9	54.5	24.2	31.8	53.0	4.5		
	85～89	37	18	17	12	14	18	1		48.6	45.9	32.4	37.8	48.6	2.7		
	90～	13	4	3	3	5	5			30.8	23.1	23.1	38.5	38.5			
男性計	489	149	278	102	145	259	12	1		30.5	56.9	20.9	29.7	53.0	2.5	0.2	
男 性	1～4	17	2	8	5	4	13	2		11.8	47.1	29.4	23.5	76.5	11.8		
	5～9	20		14	7	4	15				70.0	35.0	20.0	75.0			
	10～14	29	5	20	10	5	19			17.2	69.0	34.5	17.2	65.5			
	15～19	28	9	19	4	5	20	1		32.1	67.9	14.3	17.9	71.4	3.6		
	20～24	5	1	4		5				20.0	80.0			100.0			
	25～29	14	2	7	2	5	8	1		14.3	50.0	14.3	35.7	57.1	7.1		
	30～34	23	9	6	3	6	16	1		39.1	26.1	13.0	26.1	69.6	4.3		
	35～39	32	9	21	6	11	19			28.1	65.6	18.8	34.4	59.4			
	40～44	27	8	15	3	6	15			29.6	55.6	11.1	22.2	55.6			
	45～49	35	14	17	3	6	20			40.0	48.6	8.6	17.1	57.1			
	50～54	25	8	13	6	10	12	1		32.0	52.0	24.0	40.0	48.0	4.0		
	55～59	17	6	11	3	4	9	1		35.3	64.7	17.6	23.5	52.9	5.9		
	60～64	33	9	19	8	9	17	1		27.3	57.6	24.2	27.3	51.5	3.0		
	65～69	48	17	32	9	14	23	2		35.4	66.7	18.8	29.2	47.9	4.2		
	70～74	46	17	27	10	19	16			37.0	58.7	21.7	41.3	34.8			
	75～79	40	18	19	9	18	13		1	45.0	47.5	22.5	45.0	32.5		2.5	
	80～84	32	11	17	8	11	12	2		34.4	53.1	25.0	34.4	37.5	6.3		
	85～89	14	4	7	4	6	5			28.6	50.0	28.6	42.9	35.7			
	90～	4		2	2	2	2				50.0	50.0	50.0	50.0			
女性計	615	194	412	204	198	377	31			31.5	67.0	33.2	32.2	61.3	5.0		
女 性	1～4	22	5	10	4	10	12	1		22.7	45.5	18.2	45.5	54.5	4.5		
	5～9	25	4	18	10	9	14			16.0	72.0	40.0	36.0	56.0			
	10～14	24	1	19	9	4	16			4.2	79.2	37.5	16.7	66.7			
	15～19	29	5	22	2	3	20			17.2	75.9	6.9	10.3	69.0			
	20～24	8	5	3	1	2	5			62.5	37.5	12.5	25.0	62.5			
	25～29	17	7	10	3	1	16	1		41.2	58.8	17.6	5.9	94.1	5.9		
	30～34	28	9	21	10	10	17	1		32.1	75.0	35.7	35.7	60.7	3.6		
	35～39	34	11	21	9	7	27			32.4	61.8	26.5	20.6	79.4			
	40～44	35	10	26	18	7	25			28.6	74.3	51.4	20.0	71.4			
	45～49	36	11	24	12	7	27	3		30.6	66.7	33.3	19.4	75.0	8.3		
	50～54	24	8	17	10	8	11	2		33.3	70.8	41.7	33.3	45.8	8.3		
	55～59	23	5	17	11	7	17	3		21.7	73.9	47.8	30.4	73.9	13.0		
	60～64	42	15	25	13	17	27	3		35.7	59.5	31.0	40.5	64.3	7.1		
	65～69	71	22	56	26	32	37	4		31.0	78.9	36.6	45.1	52.1	5.6		
	70～74	74	23	52	30	30	41	10		31.1	70.3	40.5	40.5	55.4	13.5		
	75～79	57	19	41	19	23	26	1		33.3	71.9	33.3	40.4	45.6	1.8		
	80～84	34	16	19	8	10	23	1		47.1	55.9	23.5	29.4	67.6	2.9		
	85～89	23	14	10	8	8	13	1		60.9	43.5	34.8	34.8	56.5	4.3		
	90～	9	4	1	1	3	3			44.4	11.1	11.1	33.3	33.3			

表 16 歯みがき時間(1回あたり何分くらい歯をみがきますか。)

年齢	総数	実数(人)				計	実数(%)			
		3分以内	3～10分	10分以上	不詳		3分以内	3～10分	10分以上	不詳
男女計	1,104	745	331	24	4	100.0	67.5	30.0	2.2	0.4
男女	1～4	39	30	8	1	100.0	76.9	20.5		2.6
	5～9	45	42	3		100.0	93.3	6.7		
	10～14	53	44	9		100.0	83.0	17.0		
	15～19	57	36	19	2	100.0	63.2	33.3	3.5	
	20～24	13	7	4	2	100.0	53.8	30.8	15.4	
	25～29	31	17	13	1	100.0	54.8	41.9	3.2	
	30～34	51	29	20	2	100.0	56.9	39.2	3.9	
	35～39	66	33	31	2	100.0	50.0	47.0	3.0	
	40～44	62	37	23	2	100.0	59.7	37.1	3.2	
	45～49	71	47	24		100.0	66.2	33.8		
	50～54	49	30	16	3	100.0	61.2	32.7	6.1	
	55～59	40	25	14	1	100.0	62.5	35.0	2.5	
	60～64	75	53	22		100.0	70.7	29.3		
	65～69	119	86	33		100.0	72.3	27.7		
	70～74	120	78	38	3	100.0	65.0	31.7	2.5	0.8
	75～79	97	68	26	3	100.0	70.1	26.8	3.1	
	80～84	66	43	20	3	100.0	65.2	30.3	4.5	
	85～89	37	31	6		100.0	83.8	16.2		
	90～	13	9	2	2	100.0	69.2	15.4		15.4
男性計	489	335	140	12	2	100.0	68.5	28.6	2.5	0.4
男性	1～4	17	14	2	1	100.0	82.4	11.8		5.9
	5～9	20	19	1		100.0	95.0	5.0		
	10～14	29	22	7		100.0	75.9	24.1		
	15～19	28	17	9	2	100.0	60.7	32.1	7.1	
	20～24	5	1	3	1	100.0	20.0	60.0	20.0	
	25～29	14	8	5	1	100.0	57.1	35.7	7.1	
	30～34	23	12	9	2	100.0	52.2	39.1	8.7	
	35～39	32	19	12	1	100.0	59.4	37.5	3.1	
	40～44	27	17	9	1	100.0	63.0	33.3	3.7	
	45～49	35	26	9		100.0	74.3	25.7		
	50～54	25	15	8	2	100.0	60.0	32.0	8.0	
	55～59	17	9	7	1	100.0	52.9	41.2	5.9	
	60～64	33	24	9		100.0	72.7	27.3		
	65～69	48	36	12		100.0	75.0	25.0		
	70～74	46	35	10	1	100.0	76.1	21.7		2.2
	75～79	40	27	13		100.0	67.5	32.5		
	80～84	32	18	13	1	100.0	56.3	40.6	3.1	
	85～89	14	12	2		100.0	85.7	14.3		
	90～	4	4			100.0	100.0			
女性計	615	410	191	12	2	100.0	66.7	31.1	2.0	0.3
女性	1～4	22	16	6		100.0	72.7	27.3		
	5～9	25	23	2		100.0	92.0	8.0		
	10～14	24	22	2		100.0	91.7	8.3		
	15～19	29	19	10		100.0	65.5	34.5		
	20～24	8	6	1	1	100.0	75.0	12.5	12.5	
	25～29	17	9	8		100.0	52.9	47.1		
	30～34	28	17	11		100.0	60.7	39.3		
	35～39	34	14	19	1	100.0	41.2	55.9	2.9	
	40～44	35	20	14	1	100.0	57.1	40.0	2.9	
	45～49	36	21	15		100.0	58.3	41.7		
	50～54	24	15	8	1	100.0	62.5	33.3	4.2	
	55～59	23	16	7		100.0	69.6	30.4		
	60～64	42	29	13		100.0	69.0	31.0		
	65～69	71	50	21		100.0	70.4	29.6		
	70～74	74	43	28	3	100.0	58.1	37.8	4.1	
	75～79	57	41	13	3	100.0	71.9	22.8	5.3	
	80～84	34	25	7	2	100.0	73.5	20.6	5.9	
	85～89	23	19	4		100.0	82.6	17.4		
	90～	9	5	2	2	100.0	55.6	22.2		22.2

表 17 歯間部清掃用具の使用（歯ブラシ以外にどのような歯間部清掃用器具を使用していますか。）

（複数回答）

年齢	総数	実数(人)					実数(%)				
		デンタルフロス	歯間ブラシ	その他（口腔洗浄器等）	使用していない	不詳	デンタルフロス	歯間ブラシ	その他（口腔洗浄器等）	使用していない	不詳
男女計	1,104	149	270	58	685	11	13.5	24.5	5.3	62.0	1.0
男女	1～4	39	2	4	34		5.1	10.3		87.2	
	5～9	45	2		43		4.4			95.6	
	10～14	53	3	3	44	1	5.7	5.7	5.7	83.0	1.9
	15～19	57	3	1	52		5.3	1.8	1.8	91.2	
	20～24	13	3	3	8		23.1	23.1		61.5	
	25～29	31	5	6	20	1	16.1	19.4		64.5	3.2
	30～34	51	11	4	36		21.6	7.8	5.9	70.6	
	35～39	66	14	13	41		21.2	19.7	4.5	62.1	
	40～44	62	15	8	38		24.2	12.9	4.8	61.3	
	45～49	71	20	20	36	1	28.2	28.2	1.4	50.7	1.4
	50～54	49	9	14	28		18.4	28.6	10.2	57.1	
	55～59	40	6	14	16	2	15.0	35.0	17.5	40.0	5.0
	60～64	75	10	25	41	1	13.3	33.3	8.0	54.7	1.3
	65～69	119	16	45	58	1	13.4	37.8	7.6	48.7	0.8
	70～74	120	18	46	60	1	15.0	38.3	4.2	50.0	0.8
	75～79	97	6	32	56	1	6.2	33.0	8.2	57.7	1.0
	80～84	66	4	25	36		6.1	37.9	3.0	54.5	
	85～89	37	2	6	28		5.4	16.2	5.4	75.7	
	90～	13		1	10	2		7.7		76.9	15.4
男性計	489	51	93	22	336	6	10.4	19.0	4.5	68.7	1.2
男性	1～4	17	1		16			5.9		94.1	
	5～9	20			20					100.0	
	10～14	29	2	1	24	1	6.9	3.4	3.4	82.8	3.4
	15～19	28	1		26		3.6		3.6	92.9	
	20～24	5	2	2	2		40.0	40.0		40.0	
	25～29	14	2	1	10	1	14.3	7.1		71.4	7.1
	30～34	23	6	1	17		26.1	4.3	4.3	73.9	
	35～39	32	5	5	22		15.6	15.6		68.8	
	40～44	27	6	3	17		22.2	11.1	3.7	63.0	
	45～49	35	11	8	18	1	31.4	22.9		51.4	2.9
	50～54	25	2	6	17		8.0	24.0	16.0	68.0	
	55～59	17	2	4	9	2	11.8	23.5	11.8	52.9	11.8
	60～64	33	2	7	24		6.1	21.2	3.0	72.7	
	65～69	48	3	13	30		6.3	27.1	10.4	62.5	
	70～74	46	3	14	29		6.5	30.4		63.0	
	75～79	40	2	14	22	1	5.0	35.0	10.0	55.0	2.5
	80～84	32	2	9	20		6.3	28.1	3.1	62.5	
	85～89	14		3	10			21.4	7.1	71.4	
	90～	4		1	3			25.0		75.0	
女性計	615	98	177	36	349	5	15.9	28.8	5.9	56.7	0.8
女性	1～4	22	2	3	18		9.1	13.6		81.8	
	5～9	25	2		23		8.0			92.0	
	10～14	24	1	2	20		4.2	8.3	8.3	83.3	
	15～19	29	2	1	26		6.9	3.4		89.7	
	20～24	8	1	1	6		12.5	12.5		75.0	
	25～29	17	3	5	10		17.6	29.4		58.8	
	30～34	28	5	3	19		17.9	10.7	7.1	67.9	
	35～39	34	9	8	19		26.5	23.5	8.8	55.9	
	40～44	35	9	5	21		25.7	14.3	5.7	60.0	
	45～49	36	9	12	18		25.0	33.3	2.8	50.0	
	50～54	24	7	8	11		29.2	33.3	4.2	45.8	
	55～59	23	4	10	7		17.4	43.5	21.7	30.4	
	60～64	42	8	18	17	1	19.0	42.9	11.9	40.5	2.4
	65～69	71	13	32	28	1	18.3	45.1	5.6	39.4	1.4
	70～74	74	15	32	31	1	20.3	43.2	6.8	41.9	1.4
	75～79	57	4	18	34		7.0	31.6	7.0	59.6	
	80～84	34	2	16	16		5.9	47.1	2.9	47.1	
	85～89	23	2	3	18		8.7	13.0	4.3	78.3	
	90～	9			7	2				77.8	22.2

表 18 フッ化物配合歯磨剤の使用(フッ化物配合歯磨剤を使用していますか)

年齢	総数	実数(人)				計	実数(%)			
		使用して いる	使用して いない	わからない	不詳		使用して いる	使用して いない	わからない	不詳
男女計	1,121	497	300	320	4	100.0	44.3	26.8	28.5	0.4
男女	1～4	39	23	14	2	100.0	59.0	35.9	5.1	
	5～9	45	31	11	3	100.0	68.9	24.4	6.7	
	10～14	53	28	13	12	100.0	52.8	24.5	22.6	
	15～19	57	19	16	22	100.0	33.3	28.1	38.6	
	20～24	13	5	2	6	100.0	38.5	15.4	46.2	
	25～29	31	12	10	9	100.0	38.7	32.3	29.0	
	30～34	51	24	8	19	100.0	47.1	15.7	37.3	
	35～39	66	27	22	17	100.0	40.9	33.3	25.8	
	40～44	62	29	15	18	100.0	46.8	24.2	29.0	
	45～49	72	28	19	25	100.0	38.9	26.4	34.7	
	50～54	49	24	14	11	100.0	49.0	28.6	22.4	
	55～59	40	17	4	18	100.0	42.5	10.0	45.0	2.5
	60～64	75	41	17	17	100.0	54.7	22.7	22.7	
	65～69	120	56	29	35	100.0	46.7	24.2	29.2	
	70～74	125	46	47	31	100.0	36.8	37.6	24.8	0.8
	75～79	99	37	24	38	100.0	37.4	24.2	38.4	
	80～84	68	32	14	21	100.0	47.1	20.6	30.9	1.5
	85～89	40	13	16	11	100.0	32.5	40.0	27.5	
	90～	16	5	5	5	100.0	31.3	31.3	31.3	6.3
男性計	499	212	131	155	1	100.0	42.5	26.3	31.1	0.2
男性	1～4	17	10	7		100.0	58.8	41.2		
	5～9	20	13	5	2	100.0	65.0	25.0	10.0	
	10～14	29	17	4	8	100.0	58.6	13.8	27.6	
	15～19	28	10	10	8	100.0	35.7	35.7	28.6	
	20～24	5	3		2	100.0	60.0		40.0	
	25～29	14	6	4	4	100.0	42.9	28.6	28.6	
	30～34	23	9	2	12	100.0	39.1	8.7	52.2	
	35～39	32	11	9	12	100.0	34.4	28.1	37.5	
	40～44	27	15	5	7	100.0	55.6	18.5	25.9	
	45～49	36	10	11	15	100.0	27.8	30.6	41.7	
	50～54	25	12	8	5	100.0	48.0	32.0	20.0	
	55～59	17	9	3	5	100.0	52.9	17.6	29.4	
	60～64	33	15	8	10	100.0	45.5	24.2	30.3	
	65～69	49	22	11	16	100.0	44.9	22.4	32.7	
	70～74	48	15	21	12	100.0	31.3	43.8	25.0	
	75～79	42	14	10	18	100.0	33.3	23.8	42.9	
	80～84	34	14	7	12	100.0	41.2	20.6	35.3	2.9
	85～89	15	6	5	4	100.0	40.0	33.3	26.7	
	90～	5	1	1	3	100.0	20.0	20.0	60.0	
女性計	622	285	169	165	3	100.0	45.8	27.2	26.5	0.5
女性	1～4	22	13	7	2	100.0	59.1	31.8	9.1	
	5～9	25	18	6	1	100.0	72.0	24.0	4.0	
	10～14	24	11	9	4	100.0	45.8	37.5	16.7	
	15～19	29	9	6	14	100.0	31.0	20.7	48.3	
	20～24	8	2	2	4	100.0	25.0	25.0	50.0	
	25～29	17	6	6	5	100.0	35.3	35.3	29.4	
	30～34	28	15	6	7	100.0	53.6	21.4	25.0	
	35～39	34	16	13	5	100.0	47.1	38.2	14.7	
	40～44	35	14	10	11	100.0	40.0	28.6	31.4	
	45～49	36	18	8	10	100.0	50.0	22.2	27.8	
	50～54	24	12	6	6	100.0	50.0	25.0	25.0	
	55～59	23	8	1	13	100.0	34.8	4.3	56.5	4.3
	60～64	42	26	9	7	100.0	61.9	21.4	16.7	
	65～69	71	34	18	19	100.0	47.9	25.4	26.8	
	70～74	77	31	26	19	100.0	40.3	33.8	24.7	1.3
	75～79	57	23	14	20	100.0	40.4	24.6	35.1	
	80～84	34	18	7	9	100.0	52.9	20.6	26.5	
	85～89	25	7	11	7	100.0	28.0	44.0	28.0	
	90～	11	4	4	2	100.0	36.4	36.4	18.2	9.1

表 19 歯科健康教育状況(正しい歯ブラシの使い方や歯のみがき方について、指導を受けたことがありますか。)

年齢		総数	実数(人)				計	実数(%)			
			受けたことがある	受けたことがないが、今後受けたいと思っている	受けたことがなく、今後も受けない	不詳		受けたことがある	受けたことがないが、今後受けたいと思っている	受けたことがなく、今後も受けない	不詳
男女計		1,121	785	88	243	5	100.0	70.0	7.9	21.7	0.4
男女	1～4	39	18	12	8	1	100.0	46.2	30.8	20.5	2.6
	5～9	45	36	7	2		100.0	80.0	15.6	4.4	
	10～14	53	45	5	3		100.0	84.9	9.4	5.7	
	15～19	57	51	3	3		100.0	89.5	5.3	5.3	
	20～24	13	10	2	1		100.0	76.9	15.4	7.7	
	25～29	31	24	3	4		100.0	77.4	9.7	12.9	
	30～34	51	35	5	11		100.0	68.6	9.8	21.6	
	35～39	66	57	3	6		100.0	86.4	4.5	9.1	
	40～44	62	47	8	7		100.0	75.8	12.9	11.3	
	45～49	72	57	3	12		100.0	79.2	4.2	16.7	
	50～54	49	39	2	8		100.0	79.6	4.1	16.3	
	55～59	40	35	3	2		100.0	87.5	7.5	5.0	
	60～64	75	53	3	19		100.0	70.7	4.0	25.3	
	65～69	120	88	3	29		100.0	73.3	2.5	24.2	
	70～74	125	78	7	40		100.0	62.4	5.6	32.0	
	75～79	99	54	13	32		100.0	54.5	13.1	32.3	
	80～84	68	38	3	26	1	100.0	55.9	4.4	38.2	1.5
	85～89	40	14	2	23	1	100.0	35.0	5.0	57.5	2.5
	90～	16	6	1	7	2	100.0	37.5	6.3	43.8	12.5
男性計		499	326	43	128	2	100.0	65.3	8.6	25.7	0.4
男性	1～4	17	8	6	2	1	100.0	47.1	35.3	11.8	5.9
	5～9	20	14	5	1		100.0	70.0	25.0	5.0	
	10～14	29	25	3	1		100.0	86.2	10.3	3.4	
	15～19	28	27		1		100.0	96.4		3.6	
	20～24	5	4	1			100.0	80.0	20.0		
	25～29	14	9	2	3		100.0	64.3	14.3	21.4	
	30～34	23	15	2	6		100.0	65.2	8.7	26.1	
	35～39	32	27	1	4		100.0	84.4	3.1	12.5	
	40～44	27	16	5	6		100.0	59.3	18.5	22.2	
	45～49	36	27	2	7		100.0	75.0	5.6	19.4	
	50～54	25	19		6		100.0	76.0		24.0	
	55～59	17	16	1			100.0	94.1	5.9		
	60～64	33	22		11		100.0	66.7		33.3	
	65～69	49	28	2	19		100.0	57.1	4.1	38.8	
	70～74	48	22	3	23		100.0	45.8	6.3	47.9	
	75～79	42	21	8	13		100.0	50.0	19.0	31.0	
	80～84	34	18	2	13	1	100.0	52.9	5.9	38.2	2.9
	85～89	15	5		10		100.0	33.3		66.7	
	90～	5	3		2		100.0	60.0		40.0	
女性計		622	459	45	115	3	100.0	73.8	7.2	18.5	0.5
女性	1～4	22	10	6	6		100.0	45.5	27.3	27.3	
	5～9	25	22	2	1		100.0	88.0	8.0	4.0	
	10～14	24	20	2	2		100.0	83.3	8.3	8.3	
	15～19	29	24	3	2		100.0	82.8	10.3	6.9	
	20～24	8	6	1	1		100.0	75.0	12.5	12.5	
	25～29	17	15	1	1		100.0	88.2	5.9	5.9	
	30～34	28	20	3	5		100.0	71.4	10.7	17.9	
	35～39	34	30	2	2		100.0	88.2	5.9	5.9	
	40～44	35	31	3	1		100.0	88.6	8.6	2.9	
	45～49	36	30	1	5		100.0	83.3	2.8	13.9	
	50～54	24	20	2	2		100.0	83.3	8.3	8.3	
	55～59	23	19	2	2		100.0	82.6	8.7	8.7	
	60～64	42	31	3	8		100.0	73.8	7.1	19.0	
	65～69	71	60	1	10		100.0	84.5	1.4	14.1	
	70～74	77	56	4	17		100.0	72.7	5.2	22.1	
	75～79	57	33	5	19		100.0	57.9	8.8	33.3	
	80～84	34	20	1	13		100.0	58.8	2.9	38.2	
	85～89	25	9	2	13	1	100.0	36.0	8.0	52.0	4.0
	90～	11	3	1	5	2	100.0	27.3	9.1	45.5	18.2

表 20 歯科健診(検診)受診状況(年に1回以上、歯の健診(検診)を受けていますか。)

年齢	総数	実数(人)			計	実数(%)		
		受けている	受けていない	不詳		受けている	受けていない	不詳
男女計	1,121	447	669	5	100.0	39.9	59.7	0.4
男女	1～4	39	21	18	100.0	53.8	46.2	
	5～9	45	39	5	100.0	86.7	11.1	2.2
	10～14	53	44	9	100.0	83.0	17.0	
	15～19	57	27	30	100.0	47.4	52.6	
	20～24	13	4	9	100.0	30.8	69.2	
	25～29	31	17	14	100.0	54.8	45.2	
	30～34	51	9	42	100.0	17.6	82.4	
	35～39	66	32	34	100.0	48.5	51.5	
	40～44	62	13	49	100.0	21.0	79.0	
	45～49	72	18	54	100.0	25.0	75.0	
	50～54	49	18	31	100.0	36.7	63.3	
	55～59	40	15	24	100.0	37.5	60.0	2.5
	60～64	75	27	48	100.0	36.0	64.0	
	65～69	120	38	82	100.0	31.7	68.3	
	70～74	125	48	77	100.0	38.4	61.6	
	75～79	99	35	63	100.0	35.4	63.6	1.0
	80～84	68	30	37	100.0	44.1	54.4	1.5
	85～89	40	11	29	100.0	27.5	72.5	
	90～	16	1	14	100.0	6.3	87.5	6.3
男性計	499	196	300	3	100.0	39.3	60.1	0.6
男性	1～4	17	9	8	100.0	52.9	47.1	
	5～9	20	17	2	100.0	85.0	10.0	5.0
	10～14	29	23	6	100.0	79.3	20.7	
	15～19	28	13	15	100.0	46.4	53.6	
	20～24	5	2	3	100.0	40.0	60.0	
	25～29	14	6	8	100.0	42.9	57.1	
	30～34	23	6	17	100.0	26.1	73.9	
	35～39	32	14	18	100.0	43.8	56.3	
	40～44	27	4	23	100.0	14.8	85.2	
	45～49	36	8	28	100.0	22.2	77.8	
	50～54	25	8	17	100.0	32.0	68.0	
	55～59	17	7	10	100.0	41.2	58.8	
	60～64	33	11	22	100.0	33.3	66.7	
	65～69	49	12	37	100.0	24.5	75.5	
	70～74	48	16	32	100.0	33.3	66.7	
	75～79	42	15	26	100.0	35.7	61.9	2.4
	80～84	34	18	15	100.0	52.9	44.1	2.9
	85～89	15	6	9	100.0	40.0	60.0	
	90～	5	1	4	100.0	20.0	80.0	
女性計	622	251	369	2	100.0	40.4	59.3	0.3
女性	1～4	22	12	10	100.0	54.5	45.5	
	5～9	25	22	3	100.0	88.0	12.0	
	10～14	24	21	3	100.0	87.5	12.5	
	15～19	29	14	15	100.0	48.3	51.7	
	20～24	8	2	6	100.0	25.0	75.0	
	25～29	17	11	6	100.0	64.7	35.3	
	30～34	28	3	25	100.0	10.7	89.3	
	35～39	34	18	16	100.0	52.9	47.1	
	40～44	35	9	26	100.0	25.7	74.3	
	45～49	36	10	26	100.0	27.8	72.2	
	50～54	24	10	14	100.0	41.7	58.3	
	55～59	23	8	14	100.0	34.8	60.9	4.3
	60～64	42	16	26	100.0	38.1	61.9	
	65～69	71	26	45	100.0	36.6	63.4	
	70～74	77	32	45	100.0	41.6	58.4	
	75～79	57	20	37	100.0	35.1	64.9	
	80～84	34	12	22	100.0	35.3	64.7	
	85～89	25	5	20	100.0	20.0	80.0	
	90～	11		10	100.0		90.9	9.1

表 21 歯科健診(検診)受診のきっかけ(受けるきっかけは何ですか。)

年齢		総数	実数(人)					計	実数(%)				
			市町からの 歯の健 診(検診) の案内	かかりつけ 医療機関 からの案 内	自分で定 期的に受 けるよう心 がけている	その他	不詳		市町からの 歯の健 診(検診) の案内	かかりつけ 医療機関 からの案 内	自分で定 期的に受 けるよう心 がけている	その他	不詳
男女計		447	5	168	166	104	4	100.0	1.1	37.6	37.1	23.3	0.9
男女	1～4	21	2	6	5	7	1	100.0	9.5	28.6	23.8	33.3	4.8
	5～9	39	1	12	7	18	1	100.0	2.6	30.8	17.9	46.2	2.6
	10～14	44	1	12	7	24		100.0	2.3	27.3	15.9	54.5	
	15～19	27		9	4	14		100.0		33.3	14.8	51.9	
	20～24	4		1	2	1		100.0		25.0	50.0	25.0	
	25～29	17		4	10	3		100.0		23.5	58.8	17.6	
	30～34	9		1	6	2		100.0		11.1	66.7	22.2	
	35～39	32		11	16	5		100.0		34.4	50.0	15.6	
	40～44	13		3	9	1		100.0		23.1	69.2	7.7	
	45～49	18		6	10	2		100.0		33.3	55.6	11.1	
	50～54	18		4	10	4		100.0		22.2	55.6	22.2	
	55～59	15		8	4	3		100.0		53.3	26.7	20.0	
	60～64	27		11	12	4		100.0		40.7	44.4	14.8	
	65～69	38		15	18	5		100.0		39.5	47.4	13.2	
	70～74	48		29	14	5		100.0		60.4	29.2	10.4	
	75～79	35	1	16	15	2	1	100.0	2.9	45.7	42.9	5.7	2.9
	80～84	30		16	10	3	1	100.0		53.3	33.3	10.0	3.3
	85～89	11		3	7	1		100.0		27.3	63.6	9.1	
	90～	1		1				100.0		100.0			
男性計		196	3	71	74	47	1	100.0	1.5	36.2	37.8	24.0	0.5
男性	1～4	9	1	2	2	4		100.0	11.1	22.2	22.2	44.4	
	5～9	17		6	5	6		100.0		35.3	29.4	35.3	
	10～14	23	1	6	2	14		100.0	4.3	26.1	8.7	60.9	
	15～19	13		4	3	6		100.0		30.8	23.1	46.2	
	20～24	2			1	1		100.0			50.0	50.0	
	25～29	6		1	3	2		100.0		16.7	50.0	33.3	
	30～34	6			5	1		100.0			83.3	16.7	
	35～39	14		4	6	4		100.0		28.6	42.9	28.6	
	40～44	4		1	3			100.0		25.0	75.0		
	45～49	8		2	5	1		100.0		25.0	62.5	12.5	
	50～54	8		3	4	1		100.0		37.5	50.0	12.5	
	55～59	7		4	2	1		100.0		57.1	28.6	14.3	
	60～64	11		6	4	1		100.0		54.5	36.4	9.1	
	65～69	12		5	6	1		100.0		41.7	50.0	8.3	
	70～74	16		8	6	2		100.0		50.0	37.5	12.5	
	75～79	15	1	9	5			100.0	6.7	60.0	33.3		
	80～84	18		7	8	2	1	100.0		38.9	44.4	11.1	5.6
	85～89	6		2	4			100.0		33.3	66.7		
	90～	1		1				100.0		100.0			
女性計		251	2	97	92	57	3	100.0	0.8	38.6	36.7	22.7	1.2
女性	1～4	12	1	4	3	3	1	100.0	8.3	33.3	25.0	25.0	8.3
	5～9	22	1	6	2	12	1	100.0	4.5	27.3	9.1	54.5	4.5
	10～14	21		6	5	10		100.0		28.6	23.8	47.6	
	15～19	14		5	1	8		100.0		35.7	7.1	57.1	
	20～24	2		1	1			100.0		50.0	50.0		
	25～29	11		3	7	1		100.0		27.3	63.6	9.1	
	30～34	3		1	1	1		100.0		33.3	33.3	33.3	
	35～39	18		7	10	1		100.0		38.9	55.6	5.6	
	40～44	9		2	6	1		100.0		22.2	66.7	11.1	
	45～49	10		4	5	1		100.0		40.0	50.0	10.0	
	50～54	10		1	6	3		100.0		10.0	60.0	30.0	
	55～59	8		4	2	2		100.0		50.0	25.0	25.0	
	60～64	16		5	8	3		100.0		31.3	50.0	18.8	
	65～69	26		10	12	4		100.0		38.5	46.2	15.4	
	70～74	32		21	8	3		100.0		65.6	25.0	9.4	
	75～79	20		7	10	2	1	100.0		35.0	50.0	10.0	5.0
	80～84	12		9	2	1		100.0		75.0	16.7	8.3	
	85～89	5		1	3	1		100.0		20.0	60.0	20.0	
	90～												

表 22-a 歯の健康意識(歯の健康について気を付けていることがありますか。)

(人) (複数回答)

年齢		総数	注意している								注意していることは特 にない	不詳
			定期的に歯 科健診(検 診)を受けて いる	定期的に歯 石除去を受 けている	定期的に歯 みがきの指 導を受けてい る	食事の後、歯 をみがいてい る	自宅で、フッ 化物配合の 製品(歯磨 剤、ジェル、 洗口剤等)を 使用している	歯みがきのと き、鏡で口の なかを見てい る	よくかんで食 べるようにし ている	その他		
男女計		1,121	269	211	56	486	275	208	330	53	235	14
男女	1～4	39	16	3	2	19	14	2	7	3	4	1
	5～9	45	23	2	2	20	21	8	6	3	7	
	10～14	53	20	3	4	19	19	10	7	2	13	
	15～19	57	11	8	2	21	9	13	8		20	
	20～24	13	3	2	1	6	3	2	3		5	
	25～29	31	14	10	2	12	4	7	5	1	4	
	30～34	51	3	5		20	7	10	10	2	15	
	35～39	66	24	20	4	23	10	18	10	2	15	2
	40～44	62	5	9	2	26	14	15	13	2	21	
	45～49	72	12	13	2	28	18	14	12	1	23	1
	50～54	49	15	13	4	24	17	8	10	2	12	
	55～59	40	9	11	3	21	7	9	8		6	
	60～64	75	12	19	6	30	22	15	20	6	10	2
	65～69	120	19	28	3	66	28	22	47	6	17	1
	70～74	125	36	26	8	59	28	29	46	6	26	
	75～79	99	22	22	8	43	24	16	57	7	13	2
	80～84	68	21	15	3	29	21	9	33	4	9	3
	85～89	40	4	2		18	6	1	22	4	11	
	90～	16				2	3		6	2	4	2
男性計		499	117	85	18	197	119	72	128	26	122	7
男性	1～4	17	7	1	1	7	6	1	3	1	1	1
	5～9	20	12	2	1	12	12	3	1	1	2	
	10～14	29	11		2	9	11	3	4	2	9	
	15～19	28	6	2	1	12	7	6	4		8	
	20～24	5	1	1	1	3	1		1		1	
	25～29	14	4	3	1	4	3	2	3	1	3	
	30～34	23	1	3		6	1	2	1	1	12	
	35～39	32	9	7	1	16	2	9	4	1	8	1
	40～44	27	1	2		8	5	3	4	1	12	
	45～49	36	6	4	1	11	6	6	4		15	1
	50～54	25	7	7	2	11	8	2	5	1	7	
	55～59	17	6	6	1	6	4	3	6		3	
	60～64	33	5	8	2	13	8	4	9	2	5	1
	65～69	49	5	7		21	11	7	19	3	11	1
	70～74	48	10	8	1	22	9	7	10	4	12	
	75～79	42	10	11	2	15	10	8	22	4	5	1
	80～84	34	13	12	1	12	11	6	17	3	4	1
	85～89	15	3	1		8	3		9	1	2	
	90～	5				1	1		2		2	
女性計		622	152	126	38	289	156	136	202	27	113	7
女性	1～4	22	9	2	1	12	8	1	4	2	3	
	5～9	25	11		1	8	9	5	5	2	5	
	10～14	24	9	3	2	10	8	7	3		4	
	15～19	29	5	6	1	9	2	7	4		12	
	20～24	8	2	1		3	2	2	2		4	
	25～29	17	10	7	1	8	1	5	2		1	
	30～34	28	2	2		14	6	8	9	1	3	
	35～39	34	15	13	3	7	8	9	6	1	7	1
	40～44	35	4	7	2	18	9	12	9	1	9	
	45～49	36	6	9	1	17	12	8	8	1	8	
	50～54	24	8	6	2	13	9	6	5	1	5	
	55～59	23	3	5	2	15	3	6	2		3	
	60～64	42	7	11	4	17	14	11	11	4	5	1
	65～69	71	14	21	3	45	17	15	28	3	6	
	70～74	77	26	18	7	37	19	22	36	2	14	
	75～79	57	12	11	6	28	14	8	35	3	8	1
	80～84	34	8	3	2	17	10	3	16	1	5	2
	85～89	25	1	1		10	3	1	13	3	9	
	90～	11				1	2		4	2	2	

表 22－b 歯の健康意識(歯の健康について気を付けていることがありますか。)

(%) (複数回答)

年齢		注意している								注意していることは特にない	不詳
		定期的に歯科健診(検診)を受けている	定期的に歯石除去を受けている	定期的に歯みがきの指導を受けている	食事の後、歯をみがいている	自宅で、フッ化物配合の製品(歯磨剤、ジェル、洗口剤等)を使用している	歯みがきのとき、鏡で口のなかを見ている	よくかんで食べるようにしている	その他		
男女計		24.0	18.8	5.0	43.4	24.5	18.6	29.4	4.7	21.0	1.2
男女	1～4	41.0	7.7	5.1	48.7	35.9	5.1	17.9	7.7	10.3	2.6
	5～9	51.1	4.4	4.4	44.4	46.7	17.8	13.3	6.7	15.6	
	10～14	37.7	5.7	7.5	35.8	35.8	18.9	13.2	3.8	24.5	
	15～19	19.3	14.0	3.5	36.8	15.8	22.8	14.0		35.1	
	20～24	23.1	15.4	7.7	46.2	23.1	15.4	23.1		38.5	
	25～29	45.2	32.3	6.5	38.7	12.9	22.6	16.1	3.2	12.9	
	30～34	5.9	9.8		39.2	13.7	19.6	19.6	3.9	29.4	
	35～39	36.4	30.3	6.1	34.8	15.2	27.3	15.2	3.0	22.7	3.0
	40～44	8.1	14.5	3.2	41.9	22.6	24.2	21.0	3.2	33.9	
	45～49	16.7	18.1	2.8	38.9	25.0	19.4	16.7	1.4	31.9	1.4
	50～54	30.6	26.5	8.2	49.0	34.7	16.3	20.4	4.1	24.5	
	55～59	22.5	27.5	7.5	52.5	17.5	22.5	20.0		15.0	
	60～64	16.0	25.3	8.0	40.0	29.3	20.0	26.7	8.0	13.3	2.7
	65～69	15.8	23.3	2.5	55.0	23.3	18.3	39.2	5.0	14.2	0.8
	70～74	28.8	20.8	6.4	47.2	22.4	23.2	36.8	4.8	20.8	
	75～79	22.2	22.2	8.1	43.4	24.2	16.2	57.6	7.1	13.1	2.0
	80～84	30.9	22.1	4.4	42.6	30.9	13.2	48.5	5.9	13.2	4.4
	85～89	10.0	5.0		45.0	15.0	2.5	55.0	10.0	27.5	
	90～				12.5	18.8		37.5	12.5	25.0	12.5
男性計		23.4	17.0	3.6	39.5	23.8	14.4	25.7	5.2	24.4	1.4
男性	1～4	41.2	5.9	5.9	41.2	35.3	5.9	17.6	5.9	5.9	5.9
	5～9	60.0	10.0	5.0	60.0	60.0	15.0	5.0	5.0	10.0	
	10～14	37.9		6.9	31.0	37.9	10.3	13.8	6.9	31.0	
	15～19	21.4	7.1	3.6	42.9	25.0	21.4	14.3		28.6	
	20～24	20.0	20.0	20.0	60.0	20.0		20.0		20.0	
	25～29	28.6	21.4	7.1	28.6	21.4	14.3	21.4	7.1	21.4	
	30～34	4.3	13.0		26.1	4.3	8.7	4.3	4.3	52.2	
	35～39	28.1	21.9	3.1	50.0	6.3	28.1	12.5	3.1	25.0	3.1
	40～44	3.7	7.4		29.6	18.5	11.1	14.8	3.7	44.4	
	45～49	16.7	11.1	2.8	30.6	16.7	16.7	11.1		41.7	2.8
	50～54	28.0	28.0	8.0	44.0	32.0	8.0	20.0	4.0	28.0	
	55～59	35.3	35.3	5.9	35.3	23.5	17.6	35.3		17.6	
	60～64	15.2	24.2	6.1	39.4	24.2	12.1	27.3	6.1	15.2	3.0
	65～69	10.2	14.3		42.9	22.4	14.3	38.8	6.1	22.4	2.0
	70～74	20.8	16.7	2.1	45.8	18.8	14.6	20.8	8.3	25.0	
	75～79	23.8	26.2	4.8	35.7	23.8	19.0	52.4	9.5	11.9	2.4
	80～84	38.2	35.3	2.9	35.3	32.4	17.6	50.0	8.8	11.8	2.9
	85～89	20.0	6.7		53.3	20.0		60.0	6.7	13.3	
	90～				20.0	20.0		40.0		40.0	
女性計		24.4	20.3	6.1	46.5	25.1	21.9	32.5	4.3	18.2	1.1
女性	1～4	40.9	9.1	4.5	54.5	36.4	4.5	18.2	9.1	13.6	
	5～9	44.0		4.0	32.0	36.0	20.0	20.0	8.0	20.0	
	10～14	37.5	12.5	8.3	41.7	33.3	29.2	12.5		16.7	
	15～19	17.2	20.7	3.4	31.0	6.9	24.1	13.8		41.4	
	20～24	25.0	12.5		37.5	25.0	25.0	25.0		50.0	
	25～29	58.8	41.2	5.9	47.1	5.9	29.4	11.8		5.9	
	30～34	7.1	7.1		50.0	21.4	28.6	32.1	3.6	10.7	
	35～39	44.1	38.2	8.8	20.6	23.5	26.5	17.6	2.9	20.6	2.9
	40～44	11.4	20.0	5.7	51.4	25.7	34.3	25.7	2.9	25.7	
	45～49	16.7	25.0	2.8	47.2	33.3	22.2	22.2	2.8	22.2	
	50～54	33.3	25.0	8.3	54.2	37.5	25.0	20.8	4.2	20.8	
	55～59	13.0	21.7	8.7	65.2	13.0	26.1	8.7		13.0	
	60～64	16.7	26.2	9.5	40.5	33.3	26.2	26.2	9.5	11.9	2.4
	65～69	19.7	29.6	4.2	63.4	23.9	21.1	39.4	4.2	8.5	
	70～74	33.8	23.4	9.1	48.1	24.7	28.6	46.8	2.6	18.2	
	75～79	21.1	19.3	10.5	49.1	24.6	14.0	61.4	5.3	14.0	1.8
	80～84	23.5	8.8	5.9	50.0	29.4	8.8	47.1	2.9	14.7	5.9
	85～89	4.0	4.0		40.0	12.0	4.0	52.0	12.0	36.0	
	90～				9.1	18.2		36.4	18.2	18.2	18.2

表 23 フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた経験(フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けたことがありますか。)

年齢		総数	実数(人)			計	実数(%)		
			ある	ない	わからない		ある	ない	わからない
男女計		137	100	31	6	100.0	73.0	22.6	4.4
男女	1	9	1	8		100.0	11.1	88.9	
	2	11	5	6		100.0	45.5	54.5	
	3	7	2	4	1	100.0	28.6	57.1	14.3
	4	12	7	5		100.0	58.3	41.7	
	5	4	2	1	1	100.0	50.0	25.0	25.0
	6	10	9	1		100.0	90.0	10.0	
	7	14	14			100.0	100.0		
	8	11	11			100.0	100.0		
	9	6	6			100.0	100.0		
	10	7	7			100.0	100.0		
	11	11	8	2	1	100.0	72.7	18.2	9.1
	12	13	11	2		100.0	84.6	15.4	
	13	11	10		1	100.0	90.9		9.1
	14	11	7	2	2	100.0	63.6	18.2	18.2
男性計		66	48	16	2	100.0	72.7	24.2	3.0
男性	1	5		5		100.0		100.0	
	2	2		2		100.0		100.0	
	3	1		1		100.0		100.0	
	4	9	6	3		100.0	66.7	33.3	
	5	2	1	1		100.0	50.0	50.0	
	6	4	4			100.0	100.0		
	7	4	4			100.0	100.0		
	8	5	5			100.0	100.0		
	9	5	5			100.0	100.0		
	10	5	5			100.0	100.0		
	11	6	3	2	1	100.0	50.0	33.3	16.7
	12	7	6	1		100.0	85.7	14.3	
	13	7	7			100.0	100.0		
	14	4	2	1	1	100.0	50.0	25.0	25.0
女性計		71	52	15	4	100.0	73.2	21.1	5.6
女性	1	4	1	3		100.0	25.0	75.0	
	2	9	5	4		100.0	55.6	44.4	
	3	6	2	3	1	100.0	33.3	50.0	16.7
	4	3	1	2		100.0	33.3	66.7	
	5	2	1		1	100.0	50.0		50.0
	6	6	5	1		100.0	83.3	16.7	
	7	10	10			100.0	100.0		
	8	6	6			100.0	100.0		
	9	1	1			100.0	100.0		
	10	2	2			100.0	100.0		
	11	5	5			100.0	100.0		
	12	6	5	1		100.0	83.3	16.7	
	13	4	3		1	100.0	75.0		25.0
	14	7	5	1	1	100.0	71.4	14.3	14.3

表 24 フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた場所(どこで受けましたか。)

(複数回答)

年齢	総数	実数(人)					実数(%)				
		市町保健センター	医療機関	保育園・幼稚園	小学校・中学校	その他	市町保健センター	医療機関	保育園・幼稚園	小学校・中学校	その他
男女計	100	16	56	13	42	1	16.0	56.0	13.0	42.0	1.0
男女	1	1	1					100.0			
	2	5	2	4			40.0	80.0			
	3	2		2				100.0			
	4	7	1	6	2		14.3	85.7	28.6		
	5	2	1	1	1		50.0	50.0	50.0		
	6	9		5	1	3		55.6	11.1	33.3	
	7	14	3	8	5	7	21.4	57.1	35.7	50.0	
	8	11	3	6		5	27.3	54.5		45.5	
	9	6		1	1	6		16.7	16.7	100.0	
	10	7	2	4		2	28.6	57.1		28.6	
	11	8		4	1	8		50.0	12.5	100.0	
	12	11	2	6		3	18.2	54.5		27.3	9.1
	13	10	1	4		7	10.0	40.0		70.0	
	14	7	1	4	2	1	14.3	57.1	28.6	14.3	
男性計	48	9	28	7	19		18.8	58.3	14.6	39.6	
男性	1										
	2										
	3										
	4	6	1	5	2		16.7	83.3	33.3		
	5	1	1		1		100.0		100.0		
	6	4		3		1		75.0		25.0	
	7	4	1	2	2	3	25.0	50.0	50.0	75.0	
	8	5	1	4		2	20.0	80.0		40.0	
	9	5		1	1	5		20.0	20.0	100.0	
	10	5	2	3		1	40.0	60.0		20.0	
	11	3		1		3		33.3		100.0	
	12	6	2	5			33.3	83.3			
	13	7	1	2		4	14.3	28.6		57.1	
	14	2		2	1			100.0	50.0		
女性計	52	7	28	6	23	1	13.5	53.8	11.5	44.2	1.9
女性	1	1		1				100.0			
	2	5	2	4			40.0	80.0			
	3	2		2				100.0			
	4	1		1				100.0			
	5	1		1				100.0			
	6	5		2	1	2		40.0	20.0	40.0	
	7	10	2	6	3	4	20.0	60.0	30.0	40.0	
	8	6	2	2		3	33.3	33.3		50.0	
	9	1				1				100.0	
	10	2		1		1		50.0		50.0	
	11	5		3	1	5		60.0	20.0	100.0	
	12	5		1		3		20.0		60.0	20.0
	13	3		2		3		66.7		100.0	
	14	5	1	2	1	1	20.0	40.0	20.0	20.0	

表 25 フッ化物塗布やフッ化物洗口等を受けた方法(どのような方法でしたか。)

(複数回答)

年齢	総数	実数(人)				実数(%)			
		塗布	洗口	その他	不詳	塗布	洗口	その他	不詳
男女計	100	78	29	3	1	78.0	29.0	3.0	1.0
男女	1	1	1			100.0			
	2	5	5			100.0			
	3	2	2			100.0			
	4	7	7	2		100.0	28.6		
	5	2	2	1		100.0	50.0		
	6	9	6	1	1	66.7	11.1	11.1	11.1
	7	14	12	7		85.7	50.0		
	8	11	8	2	1	72.7	18.2	9.1	
	9	6	4	2		66.7	33.3		
	10	7	6	1		85.7	14.3		
	11	8	5	5		62.5	62.5		
	12	11	9	2		81.8	18.2		
	13	10	6	3	1	60.0	30.0	10.0	
	14	7	5	3		71.4	42.9		
男性計	48	41	13	1		85.4	27.1	2.1	
男性	1								
	2								
	3								
	4	6	6	2		100.0	33.3		
	5	1	1	1		100.0	100.0		
	6	4	3		1	75.0		25.0	
	7	4	3	3		75.0	75.0		
	8	5	5			100.0			
	9	5	3	2		60.0	40.0		
	10	5	5			100.0			
	11	3	2	2		66.7	66.7		
	12	6	6			100.0			
	13	7	5	2		71.4	28.6		
	14	2	2	1		100.0	50.0		
女性計	52	37	16	2	1	71.2	30.8	3.8	1.9
女性	1	1	1			100.0			
	2	5	5			100.0			
	3	2	2			100.0			
	4	1	1			100.0			
	5	1	1			100.0			
	6	5	3	1	1	60.0	20.0		20.0
	7	10	9	4		90.0	40.0		
	8	6	3	2	1	50.0	33.3	16.7	
	9	1	1			100.0			
	10	2	1	1		50.0	50.0		
	11	5	3	3		60.0	60.0		
	12	5	3	2		60.0	40.0		
	13	3	1	1	1	33.3	33.3	33.3	
	14	5	3	2		60.0	40.0		

表 26 甘味食品摂取状況(間食として甘味食品・飲料を平均して1日何回とっていますか。)

年齢		総数	実数(人)					計	実数(%)				
			1回	2回	3回以上	とって いない	不詳		1回	2回	3回以上	とって いない	不詳
男女計		137	66	36	22	9	4	100.0	48.2	26.3	16.1	6.6	2.9
男女	1	9	1	5	1	1	1	100.0	11.1	55.6	11.1	11.1	11.1
	2	11	1	6	3		1	100.0	9.1	54.5	27.3		9.1
	3	7	5	2				100.0	71.4	28.6			
	4	12	5	2	4		1	100.0	41.7	16.7	33.3		8.3
	5	4	2	1			1	100.0	50.0	25.0			25.0
	6	10	4	4	1	1		100.0	40.0	40.0	10.0	10.0	
	7	14	7	6	1			100.0	50.0	42.9	7.1		
	8	11	7	2	1	1		100.0	63.6	18.2	9.1	9.1	
	9	6	5	1				100.0	83.3	16.7			
	10	7	5	1	1			100.0	71.4	14.3	14.3		
	11	11	8		2	1		100.0	72.7		18.2	9.1	
	12	13	8		2	3		100.0	61.5		15.4	23.1	
	13	11	4	3	2	2		100.0	36.4	27.3	18.2	18.2	
	14	11	4	3	4			100.0	36.4	27.3	36.4		
男性計		66	30	16	10	7	3	100.0	45.5	24.2	15.2	10.6	4.5
男性	1	5		3		1	1	100.0		60.0		20.0	20.0
	2	2		2				100.0		100.0			
	3	1		1				100.0		100.0			
	4	9	4	1	3		1	100.0	44.4	11.1	33.3		11.1
	5	2		1			1	100.0		50.0			50.0
	6	4	1	1	1	1		100.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
	7	4	1	3				100.0	25.0	75.0			
	8	5	4			1		100.0	80.0			20.0	
	9	5	4	1				100.0	80.0	20.0			
	10	5	4	1				100.0	80.0	20.0			
	11	6	4		1	1		100.0	66.7		16.7	16.7	
	12	7	5		1	1		100.0	71.4		14.3	14.3	
	13	7	1	2	2	2		100.0	14.3	28.6	28.6	28.6	
	14	4	2		2			100.0	50.0		50.0		
女性計		71	36	20	12	2	1	100.0	50.7	28.2	16.9	2.8	1.4
女性	1	4	1	2	1			100.0	25.0	50.0	25.0		
	2	9	1	4	3		1	100.0	11.1	44.4	33.3		11.1
	3	6	5	1				100.0	83.3	16.7			
	4	3	1	1	1			100.0	33.3	33.3	33.3		
	5	2	2					100.0	100.0				
	6	6	3	3				100.0	50.0	50.0			
	7	10	6	3	1			100.0	60.0	30.0	10.0		
	8	6	3	2	1			100.0	50.0	33.3	16.7		
	9	1	1					100.0	100.0				
	10	2	1		1			100.0	50.0		50.0		
	11	5	4		1			100.0	80.0		20.0		
	12	6	3		1	2		100.0	50.0		16.7	33.3	
	13	4	3	1				100.0	75.0	25.0			
	14	7	2	3	2			100.0	28.6	42.9	28.6		

表 27-a 歯・口などの悩みの状況(歯や口の中について気になりますか。)

(人) (複数回答)

年齢		総数	悩みや気になることがある								気になることは ない	不詳
			歯が痛む	歯がしみる	歯が動く	歯肉(歯ぐき)から血がでる	歯肉(歯ぐき)がはれぼったい	歯並び	歯の色	その他		
男女計		1,037	49	108	66	93	56	161	170	113	463	51
男女	10～14	53	1	2	2	4	2	12	9	1	30	
	15～19	57	3	5		6	1	19	7	1	29	2
	20～24	13	1	4		1		2	1		8	1
	25～29	31	3	1	1	5	3	5	8	1	13	4
	30～34	51	4	7		8	2	12	17	8	17	1
	35～39	66	3	10		10	2	17	13	7	22	4
	40～44	62	2	12	3	8	3	13	15	3	25	2
	45～49	72	5	6	5	7	6	15	19	5	28	2
	50～54	49	3	9	3	5	3	9	11	6	15	1
	55～59	40	3	7	6	3	2	7	6	2	17	
	60～64	75	1	7	5	6	6	8	13	15	28	4
	65～69	120	6	13	11	14	7	12	17	17	52	7
	70～74	125	5	12	10	7	10	15	18	14	60	4
	75～79	99	4	5	8	5	6	7	4	11	56	9
	80～84	68	4	8	9	3	2	6	6	9	32	6
	85～89	40	1		1	1		2	5	6	25	3
	90～	16			2		1		1	7	6	1
男性計		462	27	50	32	44	18	64	57	48	214	21
男性	10～14	29	1	1	1	3	1	2	3	1	18	
	15～19	28	1	3		4		10	4		13	1
	20～24	5		1							4	
	25～29	14	3			1	1	2	3		7	1
	30～34	23	2	5		4	1	3	6	3	9	1
	35～39	32	2	5		7		10	4	3	10	1
	40～44	27	1	6	2	6	1	5	4	2	11	1
	45～49	36	3	3	4	2	1	6	6	1	16	1
	50～54	25	1	5	1	2	2	4	5	2	8	1
	55～59	17	1	3	2		1		2	1	10	
	60～64	33		3	3	4	1	3	5	5	14	2
	65～69	49	4	3	3	3	1	3	5	6	25	2
	70～74	48	2	4	5	2	5	7	6	6	22	3
	75～79	42	3	3	5	2	2	5	1	7	21	3
	80～84	34	3	5	6	3	1	4	3	6	13	3
	85～89	15				1				4	9	1
	90～	5								1	4	
女性計		575	22	58	34	49	38	97	113	65	249	30
女性	10～14	24		1	1	1	1	10	6		12	
	15～19	29	2	2		2	1	9	3	1	16	1
	20～24	8	1	3		1		2	1		4	1
	25～29	17		1	1	4	2	3	5	1	6	3
	30～34	28	2	2		4	1	9	11	5	8	
	35～39	34	1	5		3	2	7	9	4	12	3
	40～44	35	1	6	1	2	2	8	11	1	14	1
	45～49	36	2	3	1	5	5	9	13	4	12	1
	50～54	24	2	4	2	3	1	5	6	4	7	
	55～59	23	2	4	4	3	1	7	4	1	7	
	60～64	42	1	4	2	2	5	5	8	10	14	2
	65～69	71	2	10	8	11	6	9	12	11	27	5
	70～74	77	3	8	5	5	5	8	12	8	38	1
	75～79	57	1	2	3	3	4	2	3	4	35	6
	80～84	34	1	3	3		1	2	3	3	19	3
	85～89	25	1		1			2	5	2	16	2
	90～	11			2		1		1	6	2	

表 27-b 歯・口などの悩みの状況(歯や口の中について気になることがありますか。)

(%) (複数回答)

年齢	悩みや気になることがある								気になる ことは ない	不詳
	歯が痛む	歯が しみる	歯が動く	歯肉(歯 ぐき)から 血がでる	歯肉(歯 ぐき)がは れぼった い	歯並び	歯の色	その他		
男女計	4.7	10.4	6.4	9.0	5.4	15.5	16.4	10.9	44.6	4.9
男女	10～14	1.9	3.8	3.8	7.5	3.8	22.6	17.0	1.9	56.6
	15～19	5.3	8.8		10.5	1.8	33.3	12.3	1.8	50.9
	20～24	7.7	30.8		7.7		15.4	7.7		61.5
	25～29	9.7	3.2	3.2	16.1	9.7	16.1	25.8	3.2	41.9
	30～34	7.8	13.7		15.7	3.9	23.5	33.3	15.7	33.3
	35～39	4.5	15.2		15.2	3.0	25.8	19.7	10.6	33.3
	40～44	3.2	19.4	4.8	12.9	4.8	21.0	24.2	4.8	40.3
	45～49	6.9	8.3	6.9	9.7	8.3	20.8	26.4	6.9	38.9
	50～54	6.1	18.4	6.1	10.2	6.1	18.4	22.4	12.2	30.6
	55～59	7.5	17.5	15.0	7.5	5.0	17.5	15.0	5.0	42.5
	60～64	1.3	9.3	6.7	8.0	8.0	10.7	17.3	20.0	37.3
	65～69	5.0	10.8	9.2	11.7	5.8	10.0	14.2	14.2	43.3
	70～74	4.0	9.6	8.0	5.6	8.0	12.0	14.4	11.2	48.0
	75～79	4.0	5.1	8.1	5.1	6.1	7.1	4.0	11.1	56.6
	80～84	5.9	11.8	13.2	4.4	2.9	8.8	8.8	13.2	47.1
	85～89	2.5		2.5	2.5		5.0	12.5	15.0	62.5
	90～			12.5		6.3		6.3	43.8	37.5
男性計	5.8	10.8	6.9	9.5	3.9	13.9	12.3	10.4	46.3	4.5
男性	10～14	3.4	3.4	3.4	10.3	3.4	6.9	10.3	3.4	62.1
	15～19	3.6	10.7		14.3		35.7	14.3		46.4
	20～24		20.0							80.0
	25～29	21.4			7.1	7.1	14.3	21.4		50.0
	30～34	8.7	21.7		17.4	4.3	13.0	26.1	13.0	39.1
	35～39	6.3	15.6		21.9		31.3	12.5	9.4	31.3
	40～44	3.7	22.2	7.4	22.2	3.7	18.5	14.8	7.4	40.7
	45～49	8.3	8.3	11.1	5.6	2.8	16.7	16.7	2.8	44.4
	50～54	4.0	20.0	4.0	8.0	8.0	16.0	20.0	8.0	32.0
	55～59	5.9	17.6	11.8		5.9		11.8	5.9	58.8
	60～64		9.1	9.1	12.1	3.0	9.1	15.2	15.2	42.4
	65～69	8.2	6.1	6.1	6.1	2.0	6.1	10.2	12.2	51.0
	70～74	4.2	8.3	10.4	4.2	10.4	14.6	12.5	12.5	45.8
	75～79	7.1	7.1	11.9	4.8	4.8	11.9	2.4	16.7	50.0
	80～84	8.8	14.7	17.6	8.8	2.9	11.8	8.8	17.6	38.2
	85～89				6.7				26.7	60.0
	90～								20.0	80.0
女性計	3.8	10.1	5.9	8.5	6.6	16.9	19.7	11.3	43.3	5.2
女性	10～14		4.2	4.2	4.2	4.2	41.7	25.0		50.0
	15～19	6.9	6.9		6.9	3.4	31.0	10.3	3.4	55.2
	20～24	12.5	37.5		12.5		25.0	12.5		50.0
	25～29		5.9	5.9	23.5	11.8	17.6	29.4	5.9	35.3
	30～34	7.1	7.1		14.3	3.6	32.1	39.3	17.9	28.6
	35～39	2.9	14.7		8.8	5.9	20.6	26.5	11.8	35.3
	40～44	2.9	17.1	2.9	5.7	5.7	22.9	31.4	2.9	40.0
	45～49	5.6	8.3	2.8	13.9	13.9	25.0	36.1	11.1	33.3
	50～54	8.3	16.7	8.3	12.5	4.2	20.8	25.0	16.7	29.2
	55～59	8.7	17.4	17.4	13.0	4.3	30.4	17.4	4.3	30.4
	60～64	2.4	9.5	4.8	4.8	11.9	11.9	19.0	23.8	33.3
	65～69	2.8	14.1	11.3	15.5	8.5	12.7	16.9	15.5	38.0
	70～74	3.9	10.4	6.5	6.5	6.5	10.4	15.6	10.4	49.4
	75～79	1.8	3.5	5.3	5.3	7.0	3.5	5.3	7.0	61.4
	80～84	2.9	8.8	8.8		2.9	5.9	8.8	8.8	55.9
	85～89	4.0		4.0			8.0	20.0	8.0	64.0
	90～			18.2		9.1		9.1	54.5	18.2

表 28 義歯の使用状況(義歯(入れ歯、着脱可能なもの)を使用していますか。)

年齢	総数	実数(人)			計	実数(%)		
		使用 している	使用 していない	不詳		使用 している	使用 していない	不詳
男女計	927	351	563	13	100.0	37.9	60.7	1.4
男女	20～24	13	12	1	100.0		92.3	7.7
	25～29	31	31		100.0		100.0	
	30～34	51	47		100.0	7.8	92.2	
	35～39	66	64	1	100.0	1.5	97.0	1.5
	40～44	62	59		100.0	4.8	95.2	
	45～49	72	65	2	100.0	6.9	90.3	2.8
	50～54	49	46		100.0	6.1	93.9	
	55～59	40	29		100.0	27.5	72.5	
	60～64	75	43	2	100.0	40.0	57.3	2.7
	65～69	120	59	2	100.0	49.2	49.2	1.7
	70～74	125	50		100.0	60.0	40.0	
	75～79	99	30	2	100.0	67.7	30.3	2.0
	80～84	68	20	2	100.0	67.6	29.4	2.9
	85～89	40	6	1	100.0	82.5	15.0	2.5
	90～	16	2		100.0	87.5	12.5	
男性計	405	142	256	7	100.0	35.1	63.2	1.7
男性	20～24	5	5		100.0		100.0	
	25～29	14	14		100.0		100.0	
	30～34	23	20		100.0	13.0	87.0	
	35～39	32	31		100.0	3.1	96.9	
	40～44	27	25		100.0	7.4	92.6	
	45～49	36	32	1	100.0	8.3	88.9	2.8
	50～54	25	23		100.0	8.0	92.0	
	55～59	17	14		100.0	17.6	82.4	
	60～64	33	17	2	100.0	42.4	51.5	6.1
	65～69	49	27	1	100.0	42.9	55.1	2.0
	70～74	48	19		100.0	60.4	39.6	
	75～79	42	14	1	100.0	64.3	33.3	2.4
	80～84	34	12	1	100.0	61.8	35.3	2.9
	85～89	15	2	1	100.0	80.0	13.3	6.7
	90～	5	1		100.0	80.0	20.0	
女性計	522	209	307	6	100.0	40.0	58.8	1.1
女性	20～24	8	7	1	100.0		87.5	12.5
	25～29	17	17		100.0		100.0	
	30～34	28	27		100.0	3.6	96.4	
	35～39	34	33	1	100.0		97.1	2.9
	40～44	35	34		100.0	2.9	97.1	
	45～49	36	33	1	100.0	5.6	91.7	2.8
	50～54	24	23		100.0	4.2	95.8	
	55～59	23	15		100.0	34.8	65.2	
	60～64	42	26		100.0	38.1	61.9	
	65～69	71	32	1	100.0	53.5	45.1	1.4
	70～74	77	31		100.0	59.7	40.3	
	75～79	57	16	1	100.0	70.2	28.1	1.8
	80～84	34	8	1	100.0	73.5	23.5	2.9
	85～89	25	4		100.0	84.0	16.0	
	90～	11	1		100.0	90.9	9.1	

表 29 かむ状況(かんで食べることができますか。)

年齢	総数	実数(人)					計	実数(%)				
		で食何 できるべ るもこ んがで	食一 べ部 物か がめ あな い	物か がめ 多 い い 食 べ	いこ か ん は で 食 べ る	不 詳		で食何 できるべ るもこ んがで	食一 べ部 物か がめ あな い	物か がめ 多 い い 食 べ	いこ か ん は で 食 べ る	不 詳
男女計	927	746	156	11	2	12	100.0	80.5	16.8	1.2	0.2	1.3
男 女	20～24	13	12			1	100.0	92.3				7.7
	25～29	31	31				100.0	100.0				
	30～34	51	47	3		1	100.0	92.2	5.9			2.0
	35～39	66	64	1		1	100.0	97.0	1.5			1.5
	40～44	62	54	7	1		100.0	87.1	11.3	1.6		
	45～49	72	60	10	1	1	100.0	83.3	13.9	1.4		1.4
	50～54	49	46	3			100.0	93.9	6.1			
	55～59	40	33	7			100.0	82.5	17.5			
	60～64	75	57	16		2	100.0	76.0	21.3			2.7
	65～69	120	96	21	1	2	100.0	80.0	17.5	0.8		1.7
	70～74	125	93	28	4		100.0	74.4	22.4	3.2		
	75～79	99	77	19	1	1	100.0	77.8	19.2	1.0	1.0	1.0
	80～84	68	42	23		2	100.0	61.8	33.8		1.5	2.9
	85～89	40	26	12	2		100.0	65.0	30.0	5.0		
	90～	16	8	6	1	1	100.0	50.0	37.5	6.3		6.3
男性計	405	333	62	4	2	4	100.0	82.2	15.3	1.0	0.5	1.0
男 性	20～24	5	5				100.0	100.0				
	25～29	14	14				100.0	100.0				
	30～34	23	21	2			100.0	91.3	8.7			
	35～39	32	32				100.0	100.0				
	40～44	27	22	5			100.0	81.5	18.5			
	45～49	36	30	5	1		100.0	83.3	13.9	2.8		
	50～54	25	22	3			100.0	88.0	12.0			
	55～59	17	15	2			100.0	88.2	11.8			
	60～64	33	27	5		1	100.0	81.8	15.2			3.0
	65～69	49	39	8	1	1	100.0	79.6	16.3	2.0		2.0
	70～74	48	36	11	1		100.0	75.0	22.9	2.1		
	75～79	42	35	4	1	1	100.0	83.3	9.5	2.4	2.4	2.4
	80～84	34	20	12		1	100.0	58.8	35.3		2.9	2.9
	85～89	15	12	3			100.0	80.0	20.0			
	90～	5	3	2			100.0	60.0	40.0			
女性計	522	413	94	7		8	100.0	79.1	18.0	1.3		1.5
女 性	20～24	8	7			1	100.0	87.5				12.5
	25～29	17	17				100.0	100.0				
	30～34	28	26	1		1	100.0	92.9	3.6			3.6
	35～39	34	32	1		1	100.0	94.1	2.9			2.9
	40～44	35	32	2	1		100.0	91.4	5.7	2.9		
	45～49	36	30	5		1	100.0	83.3	13.9			2.8
	50～54	24	24				100.0	100.0				
	55～59	23	18	5			100.0	78.3	21.7			
	60～64	42	30	11		1	100.0	71.4	26.2			2.4
	65～69	71	57	13		1	100.0	80.3	18.3			1.4
	70～74	77	57	17	3		100.0	74.0	22.1	3.9		
	75～79	57	42	15			100.0	73.7	26.3			
	80～84	34	22	11		1	100.0	64.7	32.4			2.9
	85～89	25	14	9	2		100.0	56.0	36.0	8.0		
	90～	11	5	4	1	1	100.0	45.5	36.4	9.1		9.1

表 30 摂食・嚥下に関する状況

A ゆっくりよくかんで食事をする

年齢		総数	実数(人)			計	実数(%)		
			はい	いいえ	不詳		はい	いいえ	不詳
男女計		927	541	370	16	100.0	58.4	39.9	1.7
男女	20～24	13	7	5	1	100.0	53.8	38.5	7.7
	25～29	31	19	12		100.0	61.3	38.7	
	30～34	51	19	32		100.0	37.3	62.7	
	35～39	66	26	39	1	100.0	39.4	59.1	1.5
	40～44	62	28	34		100.0	45.2	54.8	
	45～49	72	31	40	1	100.0	43.1	55.6	1.4
	50～54	49	29	20		100.0	59.2	40.8	
	55～59	40	23	17		100.0	57.5	42.5	
	60～64	75	38	35	2	100.0	50.7	46.7	2.7
	65～69	120	78	40	2	100.0	65.0	33.3	1.7
	70～74	125	70	52	3	100.0	56.0	41.6	2.4
	75～79	99	79	18	2	100.0	79.8	18.2	2.0
	80～84	68	48	16	4	100.0	70.6	23.5	5.9
	85～89	40	33	7		100.0	82.5	17.5	
	90～	16	13	3		100.0	81.3	18.8	
男性計		405	213	186	6	100.0	52.6	45.9	1.5
男性	20～24	5	3	2		100.0	60.0	40.0	
	25～29	14	8	6		100.0	57.1	42.9	
	30～34	23	6	17		100.0	26.1	73.9	
	35～39	32	11	21		100.0	34.4	65.6	
	40～44	27	7	20		100.0	25.9	74.1	
	45～49	36	13	23		100.0	36.1	63.9	
	50～54	25	12	13		100.0	48.0	52.0	
	55～59	17	10	7		100.0	58.8	41.2	
	60～64	33	13	19	1	100.0	39.4	57.6	3.0
	65～69	49	33	15	1	100.0	67.3	30.6	2.0
	70～74	48	27	20	1	100.0	56.3	41.7	2.1
	75～79	42	30	11	1	100.0	71.4	26.2	2.4
	80～84	34	23	9	2	100.0	67.6	26.5	5.9
	85～89	15	12	3		100.0	80.0	20.0	
	90～	5	5			100.0	100.0		
女性計		522	328	184	10	100.0	62.8	35.2	1.9
女性	20～24	8	4	3	1	100.0	50.0	37.5	12.5
	25～29	17	11	6		100.0	64.7	35.3	
	30～34	28	13	15		100.0	46.4	53.6	
	35～39	34	15	18	1	100.0	44.1	52.9	2.9
	40～44	35	21	14		100.0	60.0	40.0	
	45～49	36	18	17	1	100.0	50.0	47.2	2.8
	50～54	24	17	7		100.0	70.8	29.2	
	55～59	23	13	10		100.0	56.5	43.5	
	60～64	42	25	16	1	100.0	59.5	38.1	2.4
	65～69	71	45	25	1	100.0	63.4	35.2	1.4
	70～74	77	43	32	2	100.0	55.8	41.6	2.6
	75～79	57	49	7	1	100.0	86.0	12.3	1.8
	80～84	34	25	7	2	100.0	73.5	20.6	5.9
	85～89	25	21	4		100.0	84.0	16.0	
	90～	11	8	3		100.0	72.7	27.3	

表 30 摂食・嚥下に関する状況

B 半年前に比べて固いものが食べにくくなった

年齢		総数	実数(人)			計	実数(%)		
			はい	いいえ	不詳		はい	いいえ	不詳
男女計		927	159	750	18	100.0	17.2	80.9	1.9
男女	20～24	13		12	1	100.0		92.3	7.7
	25～29	31	1	30		100.0	3.2	96.8	
	30～34	51		51		100.0		100.0	
	35～39	66	3	62	1	100.0	4.5	93.9	1.5
	40～44	62	7	54	1	100.0	11.3	87.1	1.6
	45～49	72	9	60	3	100.0	12.5	83.3	4.2
	50～54	49	4	45		100.0	8.2	91.8	
	55～59	40	8	32		100.0	20.0	80.0	
	60～64	75	16	58	1	100.0	21.3	77.3	1.3
	65～69	120	19	99	2	100.0	15.8	82.5	1.7
	70～74	125	31	90	4	100.0	24.8	72.0	3.2
	75～79	99	21	76	2	100.0	21.2	76.8	2.0
	80～84	68	24	41	3	100.0	35.3	60.3	4.4
	85～89	40	8	32		100.0	20.0	80.0	
	90～	16	8	8		100.0	50.0	50.0	
男性計		405	68	328	9	100.0	16.8	81.0	2.2
男性	20～24	5		5		100.0		100.0	
	25～29	14		14		100.0		100.0	
	30～34	23		23		100.0		100.0	
	35～39	32	1	31		100.0	3.1	96.9	
	40～44	27	3	23	1	100.0	11.1	85.2	3.7
	45～49	36	5	30	1	100.0	13.9	83.3	2.8
	50～54	25	2	23		100.0	8.0	92.0	
	55～59	17	1	16		100.0	5.9	94.1	
	60～64	33	9	23	1	100.0	27.3	69.7	3.0
	65～69	49	9	39	1	100.0	18.4	79.6	2.0
	70～74	48	10	36	2	100.0	20.8	75.0	4.2
	75～79	42	9	32	1	100.0	21.4	76.2	2.4
	80～84	34	15	17	2	100.0	44.1	50.0	5.9
	85～89	15	2	13		100.0	13.3	86.7	
	90～	5	2	3		100.0	40.0	60.0	
女性計		522	91	422	9	100.0	17.4	80.8	1.7
女性	20～24	8		7	1	100.0		87.5	12.5
	25～29	17	1	16		100.0	5.9	94.1	
	30～34	28		28		100.0		100.0	
	35～39	34	2	31	1	100.0	5.9	91.2	2.9
	40～44	35	4	31		100.0	11.4	88.6	
	45～49	36	4	30	2	100.0	11.1	83.3	5.6
	50～54	24	2	22		100.0	8.3	91.7	
	55～59	23	7	16		100.0	30.4	69.6	
	60～64	42	7	35		100.0	16.7	83.3	
	65～69	71	10	60	1	100.0	14.1	84.5	1.4
	70～74	77	21	54	2	100.0	27.3	70.1	2.6
	75～79	57	12	44	1	100.0	21.1	77.2	1.8
	80～84	34	9	24	1	100.0	26.5	70.6	2.9
	85～89	25	6	19		100.0	24.0	76.0	
	90～	11	6	5		100.0	54.5	45.5	

表 30 摂食・嚥下に関する状況

C お茶や汁物等でむせることがある

年齢	総数	実数(人)			計	実数(%)		
		はい	いいえ	不詳		はい	いいえ	不詳
男女計	927	137	774	16	100.0	14.8	83.5	1.7
男女	20～24	13	12	1	100.0		92.3	7.7
	25～29	31	1	30	100.0	3.2	96.8	
	30～34	51	4	47	100.0	7.8	92.2	
	35～39	66	5	60	100.0	7.6	90.9	1.5
	40～44	62	5	56	100.0	8.1	90.3	1.6
	45～49	72	8	61	100.0	11.1	84.7	4.2
	50～54	49	7	42	100.0	14.3	85.7	
	55～59	40	5	35	100.0	12.5	87.5	
	60～64	75	10	64	100.0	13.3	85.3	1.3
	65～69	120	22	97	100.0	18.3	80.8	0.8
	70～74	125	21	100	100.0	16.8	80.0	3.2
	75～79	99	21	77	100.0	21.2	77.8	1.0
	80～84	68	14	52	100.0	20.6	76.5	2.9
	85～89	40	8	32	100.0	20.0	80.0	
	90～	16	6	9	100.0	37.5	56.3	6.3
男性計	405	55	342	8	100.0	13.6	84.4	2.0
男性	20～24	5	5		100.0		100.0	
	25～29	14	14		100.0		100.0	
	30～34	23	2	21	100.0	8.7	91.3	
	35～39	32	3	29	100.0	9.4	90.6	
	40～44	27	2	24	100.0	7.4	88.9	3.7
	45～49	36	4	31	100.0	11.1	86.1	2.8
	50～54	25	3	22	100.0	12.0	88.0	
	55～59	17	2	15	100.0	11.8	88.2	
	60～64	33	3	29	100.0	9.1	87.9	3.0
	65～69	49	9	39	100.0	18.4	79.6	2.0
	70～74	48	7	39	100.0	14.6	81.3	4.2
	75～79	42	9	32	100.0	21.4	76.2	2.4
	80～84	34	7	26	100.0	20.6	76.5	2.9
	85～89	15	2	13	100.0	13.3	86.7	
	90～	5	2	3	100.0	40.0	60.0	
女性計	522	82	432	8	100.0	15.7	82.8	1.5
女性	20～24	8	7	1	100.0		87.5	12.5
	25～29	17	1	16	100.0	5.9	94.1	
	30～34	28	2	26	100.0	7.1	92.9	
	35～39	34	2	31	100.0	5.9	91.2	2.9
	40～44	35	3	32	100.0	8.6	91.4	
	45～49	36	4	30	100.0	11.1	83.3	5.6
	50～54	24	4	20	100.0	16.7	83.3	
	55～59	23	3	20	100.0	13.0	87.0	
	60～64	42	7	35	100.0	16.7	83.3	
	65～69	71	13	58	100.0	18.3	81.7	
	70～74	77	14	61	100.0	18.2	79.2	2.6
	75～79	57	12	45	100.0	21.1	78.9	
	80～84	34	7	26	100.0	20.6	76.5	2.9
	85～89	25	6	19	100.0	24.0	76.0	
	90～	11	4	6	100.0	36.4	54.5	9.1

表 30 摂食・嚥下に関する状況

D 口の渇きが気になる

年齢		総数	実数(人)			計	実数(%)		
			はい	いいえ	不詳		はい	いいえ	不詳
男女計		927	160	747	20	100.0	17.3	80.6	2.2
男女	20～24	13	1	11	1	100.0	7.7	84.6	7.7
	25～29	31	2	29		100.0	6.5	93.5	
	30～34	51	3	48		100.0	5.9	94.1	
	35～39	66	12	53	1	100.0	18.2	80.3	1.5
	40～44	62	6	55	1	100.0	9.7	88.7	1.6
	45～49	72	10	59	3	100.0	13.9	81.9	4.2
	50～54	49	9	40		100.0	18.4	81.6	
	55～59	40	8	32		100.0	20.0	80.0	
	60～64	75	15	59	1	100.0	20.0	78.7	1.3
	65～69	120	21	96	3	100.0	17.5	80.0	2.5
	70～74	125	25	96	4	100.0	20.0	76.8	3.2
	75～79	99	26	71	2	100.0	26.3	71.7	2.0
	80～84	68	11	53	4	100.0	16.2	77.9	5.9
	85～89	40	8	32		100.0	20.0	80.0	
	90～	16	3	13		100.0	18.8	81.3	
男性計		405	71	324	10	100.0	17.5	80.0	2.5
男性	20～24	5	1	4		100.0	20.0	80.0	
	25～29	14	2	12		100.0	14.3	85.7	
	30～34	23	3	20		100.0	13.0	87.0	
	35～39	32	6	26		100.0	18.8	81.3	
	40～44	27	2	24	1	100.0	7.4	88.9	3.7
	45～49	36	4	31	1	100.0	11.1	86.1	2.8
	50～54	25	5	20		100.0	20.0	80.0	
	55～59	17	3	14		100.0	17.6	82.4	
	60～64	33	6	26	1	100.0	18.2	78.8	3.0
	65～69	49	10	38	1	100.0	20.4	77.6	2.0
	70～74	48	8	38	2	100.0	16.7	79.2	4.2
	75～79	42	13	28	1	100.0	31.0	66.7	2.4
	80～84	34	5	26	3	100.0	14.7	76.5	8.8
	85～89	15	2	13		100.0	13.3	86.7	
	90～	5	1	4		100.0	20.0	80.0	
女性計		522	89	423	10	100.0	17.0	81.0	1.9
女性	20～24	8		7	1	100.0		87.5	12.5
	25～29	17		17		100.0		100.0	
	30～34	28		28		100.0		100.0	
	35～39	34	6	27	1	100.0	17.6	79.4	2.9
	40～44	35	4	31		100.0	11.4	88.6	
	45～49	36	6	28	2	100.0	16.7	77.8	5.6
	50～54	24	4	20		100.0	16.7	83.3	
	55～59	23	5	18		100.0	21.7	78.3	
	60～64	42	9	33		100.0	21.4	78.6	
	65～69	71	11	58	2	100.0	15.5	81.7	2.8
	70～74	77	17	58	2	100.0	22.1	75.3	2.6
	75～79	57	13	43	1	100.0	22.8	75.4	1.8
	80～84	34	6	27	1	100.0	17.6	79.4	2.9
	85～89	25	6	19		100.0	24.0	76.0	
	90～	11	2	9		100.0	18.2	81.8	

表 30 摂食・嚥下に関する状況

E 左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる

年齢		総数	実数(人)			計	実数(%)		
			はい	いいえ	不詳		はい	いいえ	不詳
男女計		927	605	300	22	100.0	65.3	32.4	2.4
男女	20～24	13	10	2	1	100.0	76.9	15.4	7.7
	25～29	31	26	5		100.0	83.9	16.1	
	30～34	51	45	6		100.0	88.2	11.8	
	35～39	66	54	11	1	100.0	81.8	16.7	1.5
	40～44	62	43	18	1	100.0	69.4	29.0	1.6
	45～49	72	54	16	2	100.0	75.0	22.2	2.8
	50～54	49	35	14		100.0	71.4	28.6	
	55～59	40	27	12	1	100.0	67.5	30.0	2.5
	60～64	75	36	38	1	100.0	48.0	50.7	1.3
	65～69	120	68	50	2	100.0	56.7	41.7	1.7
	70～74	125	70	51	4	100.0	56.0	40.8	3.2
	75～79	99	65	31	3	100.0	65.7	31.3	3.0
	80～84	68	34	29	5	100.0	50.0	42.6	7.4
	85～89	40	28	12		100.0	70.0	30.0	
	90～	16	10	5	1	100.0	62.5	31.3	6.3
男性計		405	261	133	11	100.0	64.4	32.8	2.7
男性	20～24	5	4	1		100.0	80.0	20.0	
	25～29	14	11	3		100.0	78.6	21.4	
	30～34	23	20	3		100.0	87.0	13.0	
	35～39	32	24	8		100.0	75.0	25.0	
	40～44	27	18	8	1	100.0	66.7	29.6	3.7
	45～49	36	25	10	1	100.0	69.4	27.8	2.8
	50～54	25	17	8		100.0	68.0	32.0	
	55～59	17	14	3		100.0	82.4	17.6	
	60～64	33	16	16	1	100.0	48.5	48.5	3.0
	65～69	49	31	17	1	100.0	63.3	34.7	2.0
	70～74	48	25	21	2	100.0	52.1	43.8	4.2
	75～79	42	25	16	1	100.0	59.5	38.1	2.4
	80～84	34	15	15	4	100.0	44.1	44.1	11.8
	85～89	15	12	3		100.0	80.0	20.0	
	90～	5	4	1		100.0	80.0	20.0	
女性計		522	344	167	11	100.0	65.9	32.0	2.1
女性	20～24	8	6	1	1	100.0	75.0	12.5	12.5
	25～29	17	15	2		100.0	88.2	11.8	
	30～34	28	25	3		100.0	89.3	10.7	
	35～39	34	30	3	1	100.0	88.2	8.8	2.9
	40～44	35	25	10		100.0	71.4	28.6	
	45～49	36	29	6	1	100.0	80.6	16.7	2.8
	50～54	24	18	6		100.0	75.0	25.0	
	55～59	23	13	9	1	100.0	56.5	39.1	4.3
	60～64	42	20	22		100.0	47.6	52.4	
	65～69	71	37	33	1	100.0	52.1	46.5	1.4
	70～74	77	45	30	2	100.0	58.4	39.0	2.6
	75～79	57	40	15	2	100.0	70.2	26.3	3.5
	80～84	34	19	14	1	100.0	55.9	41.2	2.9
	85～89	25	16	9		100.0	64.0	36.0	
	90～	11	6	4	1	100.0	54.5	36.4	9.1

表 31 日常生活の状況(日常生活はどうか。)

年齢		総数	実数(人)					計	実数(%)				
			一人で も出で かどこ らま	一人 の近 所 ま けで	一 家 の 出 所 ま けで	に 付 添 か 者 け と も	ん 家 ど か ら 出 な は い ほ と		不 詳	一人で も出で かどこ らま	一人 の近 所 ま けで	に 付 添 か 者 け と も	ん 家 ど か ら 出 な は い ほ と
男女計		927	795	74	23	26	9	100.0	85.8	8.0	2.5	2.8	1.0
男女	20～24	13	11			1	1	100.0	84.6			7.7	7.7
	25～29	31	28	1	1	1		100.0	90.3	3.2	3.2	3.2	
	30～34	51	47	1	2	1		100.0	92.2	2.0	3.9	2.0	
	35～39	66	64	1			1	100.0	97.0	1.5			1.5
	40～44	62	57		3	2		100.0	91.9		4.8	3.2	
	45～49	72	68	2		1	1	100.0	94.4	2.8		1.4	1.4
	50～54	49	48	1				100.0	98.0	2.0			
	55～59	40	39			1		100.0	97.5			2.5	
	60～64	75	70	1	2	1	1	100.0	93.3	1.3	2.7	1.3	1.3
	65～69	120	114	3	1	1	1	100.0	95.0	2.5	0.8	0.8	0.8
	70～74	125	114	9	2			100.0	91.2	7.2	1.6		
	75～79	99	73	19	3	3	1	100.0	73.7	19.2	3.0	3.0	1.0
	80～84	68	44	12	5	5	2	100.0	64.7	17.6	7.4	7.4	2.9
	85～89	40	16	17	2	4	1	100.0	40.0	42.5	5.0	10.0	2.5
90～	16	2	7	2	5		100.0	12.5	43.8	12.5	31.3		
男性計		405	354	26	9	11	5	100.0	87.4	6.4	2.2	2.7	1.2
男性	20～24	5	4			1		100.0	80.0			20.0	
	25～29	14	14					100.0	100.0				
	30～34	23	21		1	1		100.0	91.3		4.3	4.3	
	35～39	32	31	1				100.0	96.9	3.1			
	40～44	27	24		2	1		100.0	88.9		7.4	3.7	
	45～49	36	33	2		1		100.0	91.7	5.6		2.8	
	50～54	25	24	1				100.0	96.0	4.0			
	55～59	17	16			1		100.0	94.1			5.9	
	60～64	33	31		1		1	100.0	93.9		3.0		3.0
	65～69	49	47	1			1	100.0	95.9	2.0			2.0
	70～74	48	45	3				100.0	93.8	6.3			
	75～79	42	30	8	1	2	1	100.0	71.4	19.0	2.4	4.8	2.4
	80～84	34	25	4	1	3	1	100.0	73.5	11.8	2.9	8.8	2.9
	85～89	15	8	5	1		1	100.0	53.3	33.3	6.7		6.7
90～	5	1	1	2	1		100.0	20.0	20.0	40.0	20.0		
女性計		522	441	48	14	15	4	100.0	84.5	9.2	2.7	2.9	0.8
女性	20～24	8	7				1	100.0	87.5				12.5
	25～29	17	14	1	1	1		100.0	82.4	5.9	5.9	5.9	
	30～34	28	26	1	1			100.0	92.9	3.6	3.6		
	35～39	34	33				1	100.0	97.1				2.9
	40～44	35	33		1	1		100.0	94.3		2.9	2.9	
	45～49	36	35				1	100.0	97.2				2.8
	50～54	24	24					100.0	100.0				
	55～59	23	23					100.0	100.0				
	60～64	42	39	1	1	1		100.0	92.9	2.4	2.4	2.4	
	65～69	71	67	2	1	1		100.0	94.4	2.8	1.4	1.4	
	70～74	77	69	6	2			100.0	89.6	7.8	2.6		
	75～79	57	43	11	2	1		100.0	75.4	19.3	3.5	1.8	
	80～84	34	19	8	4	2	1	100.0	55.9	23.5	11.8	5.9	2.9
	85～89	25	8	12	1	4		100.0	32.0	48.0	4.0	16.0	
90～	11	1	6		4		100.0	9.1	54.5		36.4		

表 32 咀嚼力別 年齢

年齢		総数	実数(人)					計	実数(%)				
			か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ く て い る	か 非 常 に よ く		か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ く て い る	か 非 常 に よ く
総数		414	7	4	54	190	159	100.0	1.7	1.0	13.0	45.9	38.4
年 齢	20歳代	12			1	6	5	100.0	0.0	0.0	8.3	50.0	41.7
	30歳代	48			1	22	25	100.0	0.0	0.0	2.1	45.8	52.1
	40歳代	40			3	18	19	100.0	0.0	0.0	7.5	45.0	47.5
	50歳代	34			3	10	21	100.0	0.0	0.0	8.8	29.4	61.8
	60歳代	96	1	2	10	41	42	100.0	1.0	2.1	10.4	42.7	43.8
	70歳代	125		1	24	66	34	100.0	0.0	0.8	19.2	52.8	27.2
	80歳以上	59	6	1	12	27	13	100.0	10.2	1.7	20.3	45.8	22.0

表 33 咀嚼力別 義歯の使用状況(義歯(入れ歯、着脱可能なもの)を使用していますか。)

		総数	実数(人)					計	実数(%)				
			か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ く て い る	か 非 常 に よ く		か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ く て い る	か 非 常 に よ く
総 数		414	7	4	54	190	159	100.0	1.7	1.0	13.0	45.9	38.4
義 歯 の 使 用 状 況	使用している	158	5	3	35	82	33	100.0	3.2	1.9	22.2	51.9	20.9
	使用していない	248	2	1	18	104	123	100.0	0.8	0.4	7.3	41.9	49.6
	不詳	8	-	-	1	4	3	100.0	-	-	12.5	50.0	37.5

表 34 咀嚼力別 かむ状況(かんで食べることができますか。)

		総数	実数(人)					計	実数(%)				
			か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ く て い る	か 非 常 に よ く		か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ く て い る	か 非 常 に よ く
総 数		414	7	4	54	190	159	100.0	1.7	1.0	13.0	45.9	38.4
か む 状 況	何でもかんで食べることができる	346	5	3	36	161	141	100.0	1.4	0.9	10.4	46.5	40.8
	一部かめない食べ物がある	57	1	1	14	27	14	100.0	1.8	1.8	24.6	47.4	24.6
	かめない食べ物が多い	3	-	-	2	-	1	100.0	-	-	66.7	-	33.3
	かんで食べることはできない	2	1	-	1	-	-	100.0	50.0	-	50.0	-	-
	不詳	6	-	-	1	2	3	100.0	-	-	16.7	33.3	50.0

表 35 咀嚼力別 摂食・嚥下に関する状況

		総数	実数(人)					計	実数(%)				
			か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ め て い る	か 非 常 に よ く		か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ め て い る	か 非 常 に よ く
総 数		414	7	4	54	190	159	100.0	1.7	1.0	13.0	45.9	38.4
A ゆっくり よくかんで 食事をする	はい	235	5	4	35	112	79	100.0	2.1	1.7	14.9	47.7	33.6
	いいえ	172	2	-	18	75	77	100.0	1.2	-	10.5	43.6	44.8
	不詳	7	-	-	1	3	3	100.0	-	-	14.3	42.9	42.9

		総数	実数(人)					計	実数(%)				
			か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ め て い る	か 非 常 に よ く		か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ め て い る	か 非 常 に よ く
総 数		414	7	4	54	190	159	100.0	1.7	1.0	13.0	45.9	38.4
B 半年前に 比べて固いも のが食べにく くなった	はい	67	1	2	12	35	17	100.0	1.5	3.0	17.9	52.2	25.4
	いいえ	339	6	2	41	150	140	100.0	1.8	0.6	12.1	44.2	41.3
	不詳	8	-	-	1	5	2	100.0	-	-	12.5	62.5	25.0

		総数	実数(人)					計	実数(%)				
			か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ め て い る	か 非 常 に よ く		か め て い な い	か あ ま り て い な い	か め て い る	か よ め て い る	か 非 常 に よ く
総 数		414	7	4	54	190	159	100.0	1.7	1.0	13.0	45.9	38.4
E 左右両方 の 奥歯でしっかり かみしめられる	はい	267	5	1	23	121	117	100.0	1.9	0.4	8.6	45.3	43.8
	いいえ	135	2	3	27	65	38	100.0	1.5	2.2	20.0	48.1	28.1
	不詳	12	-	-	4	4	4	100.0	-	-	33.3	33.3	33.3

表 36 年次推移(永久歯)

(1) 1人平均現在歯

	昭和60年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年
総数	18.6	19.3	19.2	19.2	20.2	20.2
5歳	0.8	3.0	1.4	0.2	-	0.0
10歳	20.3	19.5	20.0	18.1	23.8	13.0
20歳	29.0	25.0	28.5	31.0	28.0	-
30歳	27.1	28.4	28.3	29.0	30.0	29.7
40歳	25.0	27.5	27.8	27.5	27.4	28.8
50歳	21.8	23.7	23.0	25.4	28.1	28.0
60歳	15.5	17.5	18.6	20.2	23.3	23.4
70歳	7.1	8.7	11.9	12.2	18.4	18.5
80歳		6.7	6.8	6.3	8.3	13.0

(2) 1人平均健全歯数

	昭和60年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年
総数	10.9	10.2	10.5	10.4	10.9	11.4
5歳	0.6	3.0	1.4	0.2	-	0.0
10歳	16.8	16.6	18.5	16.6	23.2	13.0
20歳	15.2	14.6	23.3	25.0	25.0	-
30歳	15.4	12.8	16.3	17.2	21.5	21.4
40歳	13.7	15.0	14.1	15.8	14.4	24.3
50歳	11.6	10.1	11.1	11.7	13.5	9.0
60歳	8.4	7.7	9.3	7.8	12.3	11.3
70歳	3.2	3.9	4.1	4.1	7.0	9.9
80歳	80歳～ 0.4	0.9	1.6	4.1	0.8	6.6

(3) 1人平均喪失歯数

	昭和60年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年
総数	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.1
5歳	-	-	-	-	-	0.0
10歳	-	-	-	-	-	0.0
20歳	-	0.2	0.3	-	-	-
30歳	2.1	0.4	-	0.8	-	0.1
40歳	4.2	1.1	0.6	1.0	1.4	0.0
50歳	6.9	4.9	5.7	3.4	1.5	0.0
60歳	13.1	10.7	9.8	8.3	6.8	5.0
70歳	21.1	19.3	16.1	15.8	11.9	9.9
80歳	80歳～ 25.1	21.6	21.2	21.8	21.0	15.1

(4) 1人平均DMF歯数

	昭和60年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年
総数	15.6	16.9	16.5	16.6	17.1	15.6
5歳	0.2	—	—	—	—	0.0
10歳	3.5	2.9	1.5	1.6	0.6	0.0
20歳	13.8	10.6	5.5	6.0	3.0	—
30歳	13.8	16.0	12.0	12.6	8.5	8.4
40歳	15.4	13.6	14.3	12.8	14.4	4.5
50歳	17.1	18.6	17.6	17.2	16.1	19.0
60歳	20.2	20.5	19.0	20.7	17.8	17.1
70歳	24.9	24.1	24.0	23.9	23.4	18.6
80歳	80歳～ 27.7	27.4	26.4	24.1	28.5	21.5

D:未処置歯、M:喪失歯、F:処置歯

VI 参考

【う蝕、う歯】

歯に生じたむし歯を「う蝕」と呼び、う蝕のある歯を「う歯」（又はう蝕歯）と呼ぶ。なお、う蝕罹患率は、過去にむし歯の治療を行った歯も、処置歯として含めて算出した。

【健全歯、未処置歯、処置歯】

う蝕あるいは歯科的処置の認められないものを健全歯と呼ぶ。う蝕などが有り、治療を要する状態の歯（治療中を含む）を未処置歯、過去にう蝕治療を受けた治療済みの歯を処置歯と呼ぶ。

【プロービング】

プローブという針状の器具を使って、歯周ポケットの深さを調べること。プロービング後に歯肉出血がある部位は、歯周ポケットの内壁に炎症があることを意味する。

【補綴】

歯がう蝕などで欠けたり、喪失した場合に、クラウンや義歯などの人工物で補うこと。

【智歯】

親知らずとも呼ばれる、前から数えて8番目の永久歯。第三大臼歯とも呼ばれる。

【予防填塞（フィッシャー・シーラント）】

臼歯の噛み合わせの溝を、う蝕予防の目的であらかじめ詰め物で封鎖しておくこと。

平成27年県民健康栄養調査・県民歯科疾患実態調査検討会設置要領

(目的)

第1条 県民健康栄養調査及び県民歯科疾患実態調査を実施するに当たり、調査内容及び結果の解析、活用等について専門的かつ実践的に検討するため、平成27年県民健康栄養調査・県民歯科疾患実態調査検討会（以下「検討会」という。）を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討する。

- (1) 調査内容に関する事
- (2) 調査結果の解析に関する事
- (3) 調査結果の活用に関する事
- (4) その他、調査に関する事

(組織)

第3条 検討会は、別表に掲げる有識者及び関係職員で構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成28年3月31日までとする。ただし、人事異動その他の理由により委員の変更がある場合は、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。

(会議)

第5条 検討会は、必要な都度、山口県健康福祉部健康増進課長が招集し開催する。

2 検討会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、山口県健康福祉部健康増進課健康づくり班で処理する。

附則

この要領は、平成27年9月11日から施行する。

(別 表)

平成 2 7 年県民健康栄養調査・県民歯科疾患実態調査検討会委員

所 属	役 職	氏 名	備 考
山口大学	教授	奥 田 昌 之	公衆衛生学
山口県立大学	准教授	弘 津 公 子	応用栄養学
山口県歯科医師会	理事	實能田 尚	
保健所長会	—	西 田 秀 樹	山口健康福祉 センター
保健所健康増進課長会	—	原 田 八 重	宇部健康福祉 センター
保健所栄養士研究協議会	—	河 崎 明 美	山口健康福祉 センター防府支所
市町栄養士研究協議会	—	宮 木 明 美	防府市健康増進課
山口県健康づくりセンター	健康企画班 班長	播 摩 祐 治	健康運動指導士
下関市立下関保健所	課長補佐	熊 井 一 雄	
下関市立下関保健所	栄養士	高 山 真梨子	
下関市立下関保健所	歯科衛生士	山 田 文 子	

【事務局】

山口県健康福祉部 健康増進課	調整監	小 野 みさ江
	主幹	原 田 志 織
	主任	鹿児島 久美子

**平成 27 年
県民歯科疾患実態調査報告書**

山口県健康福祉部健康増進課

〒753-8501 山口市滝町 1 番 1 号

TEL 083 (933) 2950 FAX 083 (933) 2969

